

# COMPENDIUM

**DES PRODUITS  
PHARMACEUTIQUES  
BELGES**



1931 - 1932

# LE COMPENDIUM

DES

*PRODUITS PHARMACEUTIQUES*

*BELGES*

**1931 - 1932**

*Le Compendium*  
*des Produits*  
*Pharmaceutiques Belges*

*a été rédigé avec la collaboration des principaux*  
*Laboratoires du Pays sous la direction de*

*Monsieur P. MERJAY*

*et édité par les*

*Etablissements R. I. P. R. A.*

*Société Anonyme*

*Administrateur délégué : X. STERKEN*

*106, Rue Malibran, 106*

*BRUXELLES*

# Lettre liminaire au Corps médical

---

*Monsieur le Docteur,*

*Le premier mot de cette seconde édition de notre Compendium doit être un mot de gratitude au Corps médical.*

*Les paroles d'encouragement, les lettres d'éloges reçues à la publication de notre première édition ont été pour notre œuvre un précieux stimulant.*

*Aussi, pour continuer à mériter une pareille estime, nous avons revu avec un soin jaloux toute la mise en page de cette nouvelle édition.*

*Conçue avec le même esprit, rédigée selon le même plan que nos premiers cinq mille exemplaires, cette édition a reçu simplement quelques modifications inspirées par le constant souci d'être utile et agréable au Corps médical.*

*La présentation de notre ouvrage a également été améliorée en tâchant d'en rendre l'emploi plus aisé.*

*Dans la première partie, à côté de quelques notions médicales d'usage courant, nous avons joint quelques renseignements d'ordre paramédical.*

*La deuxième partie comporte quelques produits nouveaux créés par notre industrie nationale ou omis dans l'édition précédente.*

*Dans la troisième partie, nous avons remanié la table des indications thérapeutiques pour en faciliter l'emploi par des subdivisions plus nombreuses.*

Ne dépendant d'aucune firme ni maison quelconque, libres dans notre rédaction de toute entrave, dédaigneux des critiques partiales, mais attentifs à tous les sages conseils, nous suivons notre but : Servir le Corps médical tout en concourant à l'expansion de l'Industrie pharmacologique du Pays.

En cette période de crise générale, à l'orée un peu sombre de notre second siècle d'indépendance, nous désirons être, dans notre petit domaine, un facteur peut-être minuscule, mais tenace, d'efflorescence nationale.

Nous souhaitons de tout cœur que dans ses prescriptions le Corps médical donne, à qualité égale, la préférence aux produits de chez nous.

Les pays étrangers défendent leurs produits par des mesures de protectionisme parfois draconiennes.

Nous ne demandons pas de représailles; notre idéal économique ne connaît pas de mesquin chauvinisme et la renommée de nos produits ne nécessite pas de telles armes.

Vaincre par leur propre mérite, prévaloir par leurs seules qualités, telle est l'ambition des produits contenus dans notre Compendium.

LE COMITE DE REDACTION.

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

## **PLAN DE L'OUVRAGE**

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

## PLAN DE L'OUVRAGE

---

Le Compendium se divise en trois parties.

---

### PREMIERE PARTIE

#### **Documentation générale.**

Sous ce titre se trouvent groupés divers renseignements d'importance scientifique très variable. Elle comporte surtout des chiffres et d'autres notions dont l'enregistrement encombrerait une mémoire médicale déjà si chargée. Ces renseignements éparpillés dans de nombreux volumes ont été réunis ici pour faciliter les réponses aux questions souvent oiseuses et si disparates, posées chaque jour au praticien.

Nous tenons à adresser nos remerciements anticipés à ceux qui voudraient bien nous indiquer les lacunes de cette partie.

### DEUXIEME PARTIE

#### **Lexique alphabétique des produits.**

### TROISIEME PARTIE

#### **Liste alphabétique des indications thérapeutiques.**

Cet index thérapeutique n'a pas la prétention de suppléer aux ouvrages de thérapeutique, ni même de constituer un formulaire. Il se plaît à être un simple aide-mémoire remettant dans le souvenir du praticien les divers spécialités médicales s'offrant à lui dans les très diverses affections qu'il rencontre.

PREMIÈRE PARTIE

---

**Documentation Générale**



## SOMMAIRE

---

### I. Rations normales.

1. Ration d'entretien.
2. Ration de travail.

### II. Régimes.

#### A) Généralité : Composition des principaux aliments.

#### B) Quelques types de régime.

1. Diète hydrique.
2. Régime lacté.
3. Régime déchloruré.
4. Régime hypoazoté.
5. Régime hypohydrocarboné.
6. Alimentation artificielle.
7. Alimentation des nourrissons.

### III. Durée d'incubation de quelques maladies contagieuses.

### IV. Maladies contagieuses de l'enfance et fréquentation scolaire.

### V. Déclaration de certaines maladies.

### VI. Certificats et droit de timbre.

### VII. Timbres de quittance.

### VIII. Tarif d'honoraires chirurgicaux et mutualités.

### IX. Dose maximum de quelques médicaments.

### X. Posologie d'après l'âge.

### XI. Nombre de gouttes par gramme.

### XII. Nombre de grammes par cuillerée.

## I. RATIONS NORMALES.

a) *Ration d'entretien* : Elle constitue la ration quotidienne nécessaire pour permettre de combler les dépenses de l'organisme à l'état de repos relatif.

1. Au point de vue *chimique* : Elle comporte

Aliments inorganiques :

Eau 2500 gr.

Sels 25 gr.

Aliments organiques :

1<sup>o</sup> Albumine, 90 gr.

2<sup>o</sup> Graisses, 70 gr.

3<sup>o</sup> Hydrates de Carbone, 350 gr.

Vitamines.

2. Au point de vue *dynamique*, seuls les aliments organiques interviennent dans la ration ; ils constituent ainsi la ration énergétique.

Les albumines développent environ 4 cal. par gr.

Les graisses développent environ 9 cal. par gr.

Les hydrates de carbone développent environ 4 cal. par gr.

La ration énergétique d'entretien doit donc développer environ 2400 calories représentées par :

Albumines, 90 gr., soit  $90 \times 4 = 360$  cal.

Graisses, 70 gr., soit  $70 \times 9 = 630$  cal.

Hydr. de Carb. 350 gr., soit  $350 \times 4 = 1.400$  cal.

---

2.390 cal.

Le pouvoir énergétique théorique se trouve abaissé en pratique par la combustion toujours incomplète des aliments dans l'organisme.

Cette ration d'entretien de 2.400 calories est établie pour un adulte de 70 kilogrammes ; on peut en déduire que tout sujet normal à l'état de repos demande une ration de 34 calories par kilogramme de poids.

Ces 34 calories seront fournies par

Albumines : ... ..	1 gr. 25,	soit 5 cal.
Graisses : , ... ..	1 gr.	soit 9 cal.
Hydrates de carbone : ...	5 gr.	soit 20 cal.

34 cal.

b) *Ration de travail :*

Elle aura la même composition relative, que la ration d'entretien ; mais son pouvoir énergétique s'élèvera à 50 et même 60 calories par kilogramme de poids. Dans ces dernières conditions, l'augmentation des hydrates de carbone et des graisses suivra une progression plus rapide que celle des albumines.

## II. REGIMES.

### A) Généralités.

La connaissance de la composition chimique des aliments permettra de substituer à certains aliments interdits d'autres aliments tout en respectant le pouvoir énergétique de la ration. Il faut toutefois éviter de dépasser certaines limites où l'équivalence isodynamique doit céder le pas à la nécessaire présence dans le régime d'aliments de la triade organique.

### Composition et pouvoir énergétique des principaux aliments.

(voir tableau page V et VI)

### B) Quelques types de régimes.

Les notes ci-dessous ne constituent que des indications d'ordre général. Dans chaque cas particulier, il importerait au médecin seul de préciser les applications concrètes. Il les basera tant sur l'évolution clinique et les examens de laboratoire que sur l'état constitutionnel du sujet.

# Composition et pouvoir énergétique des principaux aliments

(proportion établie pour 100 grammes)

ALIMENTS	Eau	ALBUMINES		HYDRATES de CARBONE		GRAISSE		TOTAL DES CALORIES
		Poids	Calories	Poids	Calories	Poids	Calories	
Beurre	15	0.75	3	0.50	2	84	756	761
Brochet	80	18	72	0	0	0.5	4.5	76.5
Carottes	87	1	4	10	40	0.20	1.80	45.80
Farine de Froment	12	11	44	75	300	1	9	353
Fromage (blanc)	57	32	128	2	8	5	45	181
Fromage (hollande)	37	29	116	3	12	25	225	353
Haricots frais avec cosse	64	2	8	26	104	0.6	5.4	117.4
Haricots secs et Pois	13	21	84	62	248	1.5	13.5	345.5
Lait (vache)	87	3.38	13.52	4.92	19.68	3.36	30.24	63.44
Lait de femme	88	1.90	7.60	6.23	24.92	3.70	33.30	65.82
Lait (chèvre)	87	3.75	15	4.49	17.96	4.21	37.89	70.85
Morue salée	52	28	112	0	0	0.4	3.6	115.6
Noix	7	17	68	16	64	58	522	654
Œufs de poule (100 grs) *	72	14	56	0	0	12	108	164
Pain	35	8	32	54	216	3	27	275
Pâtes alimentaires	14	10	40	70	280	3	27	347
Pommes de terre	75	2.5	10	21	84	0.1	0.9	94.9
Pommes et poires	84	0.5	2	15	60	0.3	2.70	64.70
Raisins	78	1.1	4.4	19	76	1.4	12.6	93
Riz	13	7	28	77	308	0.6	5.4	341.4
Sardines à l'huile	52	26	104	0	0	15	135	239
Sucre	0	0	0	100	400	0	0	400
Viande de bœuf	63	19	76	0	0	17	153	229
Viande de veau	70	20	80	0	0	8	72	152
Viande de mouton	63	17	68	0	0	19	171	239
Viande de porc	50	15	60	0	0	28	252	312

\* Œufs : un œuf de taille moyenne pèse 60 grammes.

### 1. *Diète hydrique.*

#### a) Indications :

Entérite infantile.  
Gastro-entérite aiguë.  
Crises d'urémie.

#### b) Modalités :

Eau bouillie ; 100 gr. toutes les trois heures. Ne pas prolonger plus de deux jours.

Bouillon de légumes ; trois litres par jour.

### 2. *Régime lacté.*

#### a) Indications :

Brightisme.  
Cardiopathies.  
Dyspepsies surtout hyperchlorhydriques.

#### b) Modalités :

Trois ou quatre litres de lait par jour en demi-litre toutes les trois heures. Rincer la bouche après chaque prise. Couper le lait avec eau alcaline.

### 3. *Régime déchloruré.*

#### a) Indications :

Œdèmes chlorurémiques.  
Obésité.  
Cures bromurées.

#### b) Modalités :

Alimentation pauvre en chlorure de sodium. Faire le bilan des chlorures (dosage des chlorures dans les aliments et dosage des chlorures urinaires) :

**Tableau de la teneur en sel de quelques aliments :**

		Teneur moyenne en gr.
Beurre frais	...	6
Bouillon	...	11
Fruits	cerises	0,14
	fraises	0,24
	prunes	0,03
Lait	...	2
Légumes	haricots	0,90
	pois	0,65
	pommes de terre	0,57
Œufs	...	1,65
Pain	...	5
Poisson	(d'eau douce) brochet	0,48
	(d'eau de mer) églefin	5,40
Viande crue	...	0,70

**4. Régime hypoazoté.**

**a) Indications :**

Néphrites urémigènes.

Intoxications.

**b) Modalités :**

Régime pauvre en albumine, surtout en albumines animales. Suivre l'évolution par l'épreuve de la phénol-sulfo-phtaléine ou le dosage d'urée du sérum. A jeûn ce taux doit être inférieur à 50 cgr. Le régime oscillera en sévérité depuis la diète hydrique jusqu'au régime presque normal en passant par l'interdiction de viande, du poisson, et des œufs.

**5. Régime hypohydrocarbène.**

**a) Indications :**

Diabète, glycémie.

b) Modalités :

La connaissance des équivalences dynamiques permettra de déterminer des rations suffisantes tout en diminuant les hydrates de carbone. Le régime tiendra compte de l'évolution de la glycosurie ou du taux de la glycémie. Celle-ci à jeun doit osciller entre 0,80 et 1 gr. 20.

L'établissement du triangle de Labbé permettra encore plus nettement de surveiller le pouvoir glycolitique de l'organisme. Les injections d'extraits glandulaires pancréatiques autorisent et même nécessitent une plus grande richesse du régime en hydrates de carbone.

6. Alimentation artificielle :

a) *Par voie nasale.*

Indications :

Contracture des muscles de la mâchoire.

Diverses affections buccales.

Modalités :

Introduire par une narine une sonde molle de 6 mm. de diamètre jusqu'au pharynx. Injecter ainsi des aliments liquides.

b) *Par voie buccale.*

Indications :

Impossibilité de déglutition.

Refus alimentaire.

Modalités :

Gavage au moyen d'une sonde molle.

Se rappeler la distance de l'arcade dentaire au cardia : 45 cm.

c) *Par voie rectale.*

Indications :

Vomissements incoercibles.

Sténose du pylore.

Modalités :

Après lavement évacuant, administrer à la sonde une heure plus tard un lavement alimentaire, par exemple :

B Lait : 250 gr.

Jaunes d'œufs : 2.

Peptone liquide : 30 gr.

Sel : 6 gr.

Laudanum : VIII gouttes.

A renouveler quatre à cinq fois par jour.

7. *Alimentation du nourrisson.*

Si l'alimentation de l'enfant doit être indiquée chaque jour par le médecin, il n'en est pas moins vrai que chez l'enfant normal, bien portant, les directives principales peuvent être schématisées d'après le tableau ci-dessous.



Age de l'enfant	Allaitement maternel	Allaitement artificiel
1 <sup>er</sup> jour	Une têtée ou un peu d'eau	Un repas de 16 gr. Mélange A
2 <sup>me</sup> jour	Deux têtées (matin et soir)	Trois repas de 20 gr. Mélange A
3 <sup>me</sup> jour	Trois têtées (6 h., 14 h., 22 h.)	Cinq repas de 40 gr. Mélange A
4 <sup>me</sup> jour	Quatre têtées (6, 11, 16, 22 h.)	Six repas de 60 gr. Mélange A
5 <sup>me</sup> jour	Cinq têtées (6, 10, 14, 18, 22 h.)	Six repas de 80 gr. Mélange A
6 <sup>me</sup> jour	Six têtées (6, 9, 12, 15, 18, 21 h.)	Six repas de 80 gr. Mélange A
7 <sup>me</sup> jour	Six têtées (une la nuit facultative)	Id. (un la nuit facult.)
7 à 15 jrs	Id.	6 ou 7 repas de 90 gr. Mélange B
15 à 30 jrs	Id.	6 ou 7 repas de 125 gr. Mélange B
2 <sup>me</sup> mois	Id.	6 ou 7 repas de 125 gr. Mélange B
3 <sup>me</sup> mois	Id.	6 ou 7 repas de 150 gr. Mélange B
4 <sup>me</sup> mois	Supprimer la têtée nocturne	6 repas de 150 gr. Mélange C
5 <sup>me</sup> mois		6 repas de 150 gr. lait pur, sucre 2 %
6 à 9 mois	Ablactation	6 repas de 175 gr. lait pur, sucre 2 %
9 <sup>me</sup> mois	Une panade	Id.
10 à 15 mois	Deux panades. Sevrage progressif	3 repas de 200 gr. de lait, 2 panades

Mélange A : Une partie de lait de vache et une partie d'eau sucrée à 10 %.

Mélange B : Deux parties de lait de vache et une partie d'eau sucrée à 10 %.

Mélange C : Trois parties de lait de vache et une partie d'eau sucrée à 10 %.

### III. DUREE D'INCUBATION DE QUELQUES MALADIES CONTAGIEUSES.

1. *Diphthérie* : deux à vingt jours.
2. *Scarlatine* : trois à quinze jours.
3. *Rougeole* : Dix à quinze jours.
4. *Coqueluche* : Quatre à huit jours.
5. *Oreillons* : Quinze à vingt jours.
6. *Choléra* : Un à trois jours.
7. *Thyphoïde* : Quinze à vingt-huit jours.
8. *Variole* : Dix à quinze jours.
9. *Varicelle* : Quinze à dix-neuf jours.
10. *Rage* : Quinze à soixante jours.

### IV. MALADIES CONTAGIEUSES DE L'ENFANCE ET FREQUENTATION SCOLAIRE.

S'il est évident que l'enfant malade sera retiré de l'école dès le moindre symptôme suspect, il faut exiger aussi que les frères et sœurs de l'enfant ainsi que tous les enfants de la même maison s'abstiennent de fréquenter l'école.

En règle générale, les enfants de l'entourage du contagieux ne seront admis à l'école que quinze jours après que l'isolement du malade aura été réalisé — encore faut-il qu'ils ne présentent aucun signe suspect.

L'enfant guéri ne pourra rentrer à l'école qu'avec un certificat médical et après un délai déterminé par la maladie notamment :

- a) En cas de *rougeole* : quinze jours depuis le début de l'éruption.
- b) En cas d'*oreillons* : vingt jours depuis le début de l'affection.
- c) En cas de *coqueluche* : trois semaines depuis la disparition des quintes pathognomoniques.

d) En cas de *scarlatine* : cessation de toute desquamation et désinfection terminale.

e) En cas de *diphthérie* : négativité de toute recherche bactériologique et désinfection terminale.

La désinfection terminale en cas de diphthérie ou de scarlatine sera exécutée par les soins de l'autorité à la demande du médecin.

## V. DECLARATION DE CERTAINES MALADIES.

*Est obligatoire* la déclaration de tout cas de :

- Fièvre typhoïde.
- Typhus exanthématique.
- Variole et varioloïde.
- Scarlatine.
- Diphthérie.
- Dysentérie (dite épidémique).

*Est demandée* la déclaration de :

a) tout cas de :

- Méningite cérébro-spinale (dite épidémique).
- Rage humaine.
- Septicémie puerpérale (cas avéré ou suspect), si le secret ne s'impose pas.
- Poliomyélite.

b) De toute épidémie de :

- Rougeole.
- Coqueluche.
- Ophthalmie granuleuse.

Une fois la déclaration faite, les nouveaux foyers qui viendraient à se produire au cours de la même épidémie ne devront plus être signalés.

Cette déclaration sera adressée à l'Inspecteur d'Hygiène du Gouvernement de la Province où le cas s'est produit.

## VI. CERTIFICATS ET TIMBRE DE DIMENSION.

Les certificats médicaux subissent un droit de timbre fixe de 1 franc quelle que soit la dimension du papier. Les certificats non médicaux sont soumis au timbre de 2 fr. 50 si leur superficie ne dépasse pas 442 centimètres carrés.

Le timbre doit être annulé dans sa plus grande dimension.

Les certificats exonérés du timbre doivent indiquer en tête le motif de l'exonération.

Sont exemptés du timbre :

- 1° Les certificats médicaux concernant la milice et l'armée ;
- 2° Ceux qui sont délivrés pour être remis à l'Administration des Chemins de fer en vue du transport de dépouilles mortelles.
- 3° Ceux qui sont délivrés à une administration publique ou à un fonctionnaire public dans un intérêt administratif ;
- 4° Ceux qui sont délivrés pour le service des caisses de retraite, de secours ou de prévoyance établies avec l'approbation de l'autorité administrative ;
- 5° Les certificats médicaux dont la production doit être faite par un affilié à une société mutualiste en cette qualité ;
- 6° Les certificats médicaux à produire pour le service des caisses d'assurance contre les accidents du travail ;
- 7° Les certificats médicaux relatifs à l'exécution de la loi du 10 décembre 1924, relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ;
- 8° Les certificats médicaux nécessaires à l'exécution de la mission confiée, par la loi du 30 décembre 1924, au Fonds National de Retraite des ouvriers mineurs et aux services administratifs locaux de cette institution, dénommés Caisses de prévoyance des Ouvriers mineurs ;
- 9° Les certificats médicaux relatifs à l'exécution de la loi du 10 mars 1925, sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès des employés ;
- 10° Les certificats médicaux qui sont délivrés aux indigents.

## VII. TIMBRES DE QUITTANCE.

Les quittances pour état d'honoraires porteront un timbre de 0 fr. 20 pour 500 francs ou par tranche de cette somme.

## VIII. TARIF D'HONORAIRES CHIRURGICAUX ET MUTUALITES.

Diverses Sociétés Mutualistes ayant contrat avec des Associations Médicales Professionnelles ont de commun accord avec celles-ci réparti les principales interventions chirurgicales en opérations de grande chirurgie, moyenne chirurgie et petite chirurgie.

Le Comité de Rédaction fournira gracieusement aux Médecins qui lui en feront la demande, copie du tarif adopté par le Collège des Médecins à Bruxelles.

## IX. DOSE MAXIMA DE QUELQUES MEDICAMENTS COURANTS.

Nom du médicament	Nombre de grammes maxima	
	pour une dose	en 24 heures
Adrénaline	0,002	0,004
Caféine	0,50	1,50
Chlorhydrate de cocaïne	0,05	0,15
Chlorhydrate de morphine	0,03	0,10
Chlorure mercurique	0,02	0,06
Eau de laurier-cerise	2,00	10,00
Extrait de belladone	0,05	0,10
Extrait de jusquiame	0,10	0,30
Extrait de noix vomique	0,03	0,10
Extrait d'opium	0,075	0,25
Phosphate de codéine	0,10	0,30
Santonine	0,10	0,30
Seigle ergoté	1,00	3,00
Sulfate d'atropine	0,001	0,002
Sulfate de spartéine	0,10	0,30
Teinture de belladone	0,40	1,00
Teinture de colchique	2,00	6,00
Teinture de digitale	2,00	6,00
Teinture d'iode	0,20	0,60
Teinture de noix vomique	2,00	6,00
Teinture d'opium	1,50	5,00

## X. POSOLOGIE D'APRES L'AGE.

En général, la dose à prescrire à un enfant peut être fixée comme suit :

Jusqu'à l'âge de 2 ans :  $\frac{1}{25}$  de la dose pour adulte.

— — 4 —  $\frac{1}{10}$  — —

— — 6 —  $\frac{1}{5}$  — —

— — 8 —  $\frac{1}{4}$  — —

— — 10 —  $\frac{1}{3}$  — —

— — 13 —  $\frac{1}{2}$  — —

— — 17 —  $\frac{3}{4}$  — —

## XI. NOMBRE DE GOUTTES PAR GRAMME.

Ce tableau est rédigé en tenant compte que le compte-gouttes normal doit laisser tomber vingt gouttes pour un gramme d'eau distillée à + 15°.

Par gramme	Nombre de gouttes
Acide chlorhydrique officinal ... ..	21
Alcool à 90° ... ..	61
Alcool à 60° ... ..	52
Ammoniaque liquide officinal... ..	22
Ether officinal ... ..	90
Glycerine officinale ... ..	25
Laudanum de Sydenham... ..	33
Liqueur d'Hoffmann... ..	72
Liqueur de Fowler au 1/100° ... ..	23
Teinture de Belladone ... ..	53
Teinture de digitale... ..	53
Teinture d'iode... ..	61

## XII. NOMBRE DE GRAMMES PAR CUILLEREES.

Ce nombre est variable d'après la densité de la préparation officinale.

Forme de la préparation officinale	Contenance en grammes par cuillère		
	à soupe	à dessert	à café
Teintures et huiles	12	9	3
Solutions	16	12	4
Juleps	18	13	4,50
Sirops	21	16	5

DEUXIÈME PARTIE

**Lexique alphabétique des produits**

**POMMADE « ACETOLAN »**

Onguent à base de Liq. Lithanthr. Acet., oxyde de zinc, amidon.

**Indications :**

Toutes les formes d'eczéma, impétigo, prurits et affections à réactions prurigineuses, gerçures, ulcères.

Dépôt général :

**PHARMACIE « SIX »**

Canal de l'Ancre, 24, Anvers.

---

---

**La FAMILLE DE L'INFIRMIÈRE**

SECTION DE PLACEMENT

18, RUE DE LA SOURCE, BRUXELLES

TÉLÉPHONE 37.00.96

---

---

**LA FEUILLÉE - NAMUR (Citadelle)**

ÉTATS NERVEUX ET REPOS



## ACETYL-TANIN MEURICE

### Composition :

Ether acétique de l'acide tannique.

### Indications :

Catarrhes subaigus ou chroniques de l'intestin. Gastro-entérites. Dysenterie chronique. Diarrhée infantile chronique. Diarrhée estivale.

### Posologie :

Commencer par des doses élevées 0,75 gr. ou 1 gr. trois ou quatre fois par jour, une demi-heure à une heure après le repas, et continuer cette dose jusqu'à disparition complète des symptômes aigus. Réduire cette dose de moitié pour les enfants.

### Présentation :

Poudre : Boîtes de 25 grammes.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## A C Y L I N E

### Composition :

Acide acéto-salicylique. Papavérine. Amidon.

### Indications :

Analgésique. Antithermique. Antirhumatismal. Névralgies. Accès douloureux. Fièvre grippale. Rhumatisme articulaire aigu.

### Posologie :

Douleurs rhumatismales, goutte : 4 à 6 comprimés par jour en deux ou trois fois.

Influenza, grippe, migraine, névralgie : 2 à 3 comprimés par jour en deux ou trois fois.

### Propriété :

Grâce à l'action de la papavérine sur la musculature du pylore, l'Acyline passe non décomposé et très rapidement dans le duodénum, où sa résorption est immédiate.

### Présentation :

Comprimés : Tubes de 20 comprimés à 0,50 gr.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**ALDEHYL****Composition :**

Formaldéhyde à l'état naissant. (Combinaison lactosée de la formaldéhyde.)

**Indications :**

Antiseptique de la bouche et des voies respiratoires. Laryngite. Pharyngite. Trachéite. Angine catarrhale. Coryza. Catarrhe bronchique.

**Posologie :**

5 à 10 pastilles par jour, pour les adultes.

3 à 6 pastilles par jour, pour les enfants.

**Présentation :**

Flacons de 50 pastilles à 0,50 gr.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division: Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires: 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique: 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif:

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**ALIMENTINE MORY**

(Poudre en boîte)

**Composition :**

Farine, cacao, glycér. cal. sucre.

**Indications :**

Aliment pour enfants, convalescents, dyspeptiques.

**Doses :**

A délayer dans du lait.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**ALPHANOL**

6

Combinaison d'acide acéto-salicylique et d'acide phénylcinchoninique alpha.

**Indications :**

Rhumatisme, goutte, sciatique.

**Présentation :**

Cachets et suppositoires.

**Posologie :***Cachets* : de 3 à 4 cachets par jour ; un quart d'heure après les repas dans un peu d'eau.*Suppositoires* : Deux par jour, un le matin, l'autre le soir.**E. BURNIAT, Pharmacien-Chimiste**

Bruxelles

Concessionnaires :

**Etablissements J. Herman — Labor. S. A.**

19 à 27, rue des Cultivateurs, Bruxelles

## ALPHASE « D » (Dermatoses)

Le tube : 16 francs

### Composition :

Association d'ichtyosulfate ammonique, de baume du Pérou, d'huile de Cade, d'oxyde de zinc avec un excipient facilement absorbé par la peau : l'« Alphase ».

### Indications :

Action curative et cicatrisante puissante, grâce notamment à l'Alphase, dans les cas de Dermatoses (rebelles aux traitements ordinaires), Erythèmes des nouveaux nés, Brûlures, Gercures, Eczémas, Fissures anales, Ulcères variqueux.

*Agent général pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Congo Belge :*

**Ch. VLEUGELS, Pharmacien**  
119, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

---

## ALPHASE « R » (Rhumatismes)

Le tube : 16 francs

Puissant analgésique à base d'Alphase, excipient facilement absorbé par la peau.

### Composition :

Méthylsalicyl., Menthol., Camphoretum, Chloroforme et Alphase.

### Indications :

Rhumatismes. Goutte. Lumbago. Névrites. Sciatique. Névralgies en général.

### Mode d'emploi :

En frictions pendant quelques minutes *loco dolenti*, puis, lorsque la chose est possible, recouvrir de flanelle ou d'une feuille de coton ordinaire.

*Agent général pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Congo Belge :*

**Charles VLEUGELS, Pharmacien**  
119, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

## **ANABOLIN BIOS**

### **Composition :**

Extrait alcool-soluble physiologiquement dosé, isolé du foie des animaux adultes, selon les indications du docteur Harrower.

Boîte de 6 ampoules de 2 cc.

### **Indications :**

Abaisse la pression artérielle dans l'hypertension d'origine hépatique.

Action antagoniste de l'adrénaline, complète les fonctions du foie dans son rôle de la combustion.

L'Anabolin servira également de moyen de diagnostic pour rechercher la cause de l'hypertension.

### **Mode d'emploi :**

Le premier jour, injecter un demi cc. d'Anabolin aussitôt après détermination de la pression artérielle et, si possible, faire une seconde détermination de la pression deux ou trois heures plus tard. Le lendemain, on donnera un cc. et l'on prendra encore la pression artérielle aussitôt après. Le troisième jour, la dose sera 1 ou 2 cc., rarement 3 cc., suivant la pression artérielle; on continuera cette posologie jusqu'à ce qu'on ait injecté 10 à 12 cc. au total.

Voir également Hypotencrine.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## ANAPHYLACTINE BIOS

### Composition :

Extrait alcool-soluble de la polyprotéine en milieu physiologique (protéinothérapie). Voie interne voir anaphylase.

### Indications :

Septicémie, infections, rhumatisme, eczéma, eczéma des nourrissons; psoriasis, asthme, infections infantiles, urticaire et toutes les indications où la thérapeutique de choc est requise.

### Mode d'emploi :

Cas aigu : une injection par vingt-quatre heures. Cas chronique : une injection tous les huit à quinze jours.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

## ANAPHYLASE BIOS

### Médication antianaphylactique en association aux sels halogènes de magnésium

### Composition :

Polypeptone. Hyposulfite de magnésium. Chlorure de magnésium. Lactose. Gomme. Sucre. Col. vert méth.

### Indications :

Prophylaxie anticancéreuse, anaphylaxie et intolérance digestive, urticaire, eczéma, asthme, etc.

### Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 3 comprimés par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**ANASTAPHYLOTOXINE « BIOS »****Composition :**

- 1° Anatoxine staphylococcique.
- 2° Vaccin staphylococcique (stérilisé à l'aide d'une solution d'iode et neutralisé par l'hyposulfite de soude).
- 3° Bouillon filtrat polymicrobien.

**Indications :**

Toutes les affections d'origine staphylococcique, particulièrement chronique.

**Mode d'emploi :**

- 1° Injections d'Anastaphylotoxine tous les cinq jours de 0,2 à 1,8 cc.
- Boîte de 12 ampoules de 2 cc.
- 2° En pansement, applications locales.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**ANATOXINE DIPHTERIQUE****« BIOS »****Composition :**

Anatoxine préparée d'après la méthode de Ramon et selon la nouvelle technique. (Société de Biologie, 20 juillet 1929.)

**Indications :**

Vaccination préventive de la diphtérie.

**Mode d'emploi :**

- 1° Une ampoule d'un demi cc.
  - 2° Injection trois semaines après de 1 cc.
  - 3° Huit à dix jours après la deuxième : injection de 1 et demi cc.
- Chez les enfants de 2 à 10 ans, la réaction de Schick n'est pas nécessaire.
- Boîte de 3 ampoules de 1,5 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)



## ANESTHESIQUES OPTIMA...

Chloroforme en ampoules de 30, 50 et 100 grammes.

Ether en ampoules de 25 et 50 grammes.

Bromure d'éthyle en ampoules de 15 à 30 grammes.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

—  
Ses reliures

de bibliothèque

et de fantaisie

—  
Organisation et remise à neuf de bibliothèques

## A N O S Y L

### Composition :

Menthanol. Hydrocarb. Ethylen. Naphten.

### Indications :

Préservation des piqûres de moustiques et plus spécialement dans les contrées infectées, prophylaxie du paludisme, de la filariose, de la fièvre jaune, de la dengue et de la fièvre des Polders.

### Mode d'emploi :

Se verser une dizaine de gouttes dans le creux de la main, étendre légèrement sur les deux paumes et se passer celles-ci sur les oreilles, dans le cou, sur les chevilles, bref, sur toutes les parties exposées aux piqûres de moustiques.

*Une application, le soir, préserve, pour la nuit, des piqûres de moustiques.*

Eviter d'introduire l'Anosyl dans les yeux : il en résulterait une irritation désagréable.

### Présentation :

Flacons grand modèle, 50 grammes environ.  
Demi-flacons.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**  
12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province.

## ANTIPHLEBINE (Comprimés)

Médicament des troubles de la circulation veineuse.

Chaque comprimé contient : poudre de glande surrénale, 0,025 gr.:  
poudre corps thyroïde 0,015 gr.: poudre glande hypophyse 0,010 gr.:  
extrait de marron d'Inde 0,030 gr.: extrait sec d'Hamamelis 0,040 gr.:  
extrait d'Hydratis canadensis 0,030 gr.

### Indications :

Varices. Dilatations variqueuses. Hémorroïdes. Eczémas, Ulcères  
et œdèmes postphlébitiques. Dysménorrhée. Métorrhagies. Troubles  
de la ménopause.

### Doses :

3 à 6 comprimés par jour. Un ou deux après les repas.

L'étui de 60 comprimés : 15 francs.

Laboratoire d'Opothérapie U. T. A.

**ETABLISSEMENTS PAUL THIWSSEN**

13, rue Sainte-Véronique, Liège

Echantillons gratuits sur demande.

---

**Toutes les reliures aux**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

## A N T I P H Y M A S E

### Composition :

Vaccin antituberculeux, composé de bacilles acidophiles et acido-résistants, ayant les caractères du bacille aviaire, et ayant passé successivement par la tortue terrestre inanitiée et un petit mammifère. Ce sont donc des saprophytes atténués et ensuite réactivés par adaptation au milieu interne de l'animal à sang chaud et, par le fait même, doués de propriétés immunisantes démontrées.

### Indications :

Toutes les formes de la Tuberculose (sujets cachectiques exclus).

### Posologie :

Deux injections (par voie sous-cutanée) par mois à doses croissantes (n° 1 à 5). La dose 5 sera répétée tous les mois, puis tous les deux mois.

### Présentation :

Boîtes de 1 ampoule de 1 cc. Dosages : 1 à 5.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

## ANTITHYROÏDE BIOS

### Composition :

Sang total prélevé sur des chevaux éthyroïdés.

### Indications :

Traitement du goître exophtalmique et troubles de la maladie de Basedow, soit tachycardie, insomnie, irritabilité nerveuse, troubles génitaux, insomnie des tuberculeux, pelade nerveuse des basedowiens (Sabouraud).

### Mode d'emploi :

*Antithyroïde Bios liquide* (en milieu glyciné), de trois à six cuillerées à café par jour, progressivement, pour diminuer ensuite jusqu'à une cuillerée à café.

*Antithyroïde Bios capsules* (flacons de 30 capsules de sang desséché dans le vide) que l'on prend à la dose de 3 à 6 par jour, comme précédemment.

*Antithyroïde injectable* (boîtes de 10 ampoules, 2 cc. sérum désalbuminé). — Une injection journalière dans les cas aigus, puis espacer. Cette dernière préparation contre-indiquée chez les femmes gravides.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**APYREXINE**

(Tube de 20 comprimés)

**Composition :**

50 cgr. acide acétyl-salicylique pour 1 comprimé.

**Indications :**

Chaque fois que la médication salicyl est indiquée, antifebrile, analgésique, névralgies dentaires, grippe, maux de tête, époques douloureuses, accès de goutte, sciatique, rhumatisme, lumbago.

**Doses :**

2 à 6 comprimés dans un demi verre d'eau ou de la tisane.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**  
78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

---

**La reliure et la brochure d'art**

doivent être confiées aux

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

## ARHINE LAMBIOTTE FRERES

Composé formaldéhydo-gaïacolo-tannique chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

### Propriétés thérapeutiques :

Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

### Indications :

Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du coryza, des rhinites et rhino-pharyngites.

### Mode d'emploi :

On l'utilise soit en insufflations, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; deux à trois fois par jour et le soir au coucher dans les coryzas, rhinites, maux de gorge.

Littérature et échantillons :

**PRODUITS LAMBIOTTE FRERES**

124, avenue Rogier, Bruxelles

## ARSEBENYL

### Composition :

Dioxydiamidoarsenobenzol méthylène sulfoxyrate de sodium.

Peut être prescrit aux frais de l'Etat. (Dépêche du Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène en date du 16 novembre 1928, n° 10/60 A/6894.)

### Indications :

Traitement intraveineux de toutes les affections spirillaires : syphilis à toutes les périodes, fièvre récurrente, pian, angine de Vincent.

### Posologie :

Commencer le traitement par une dose de 0,15 gr.; augmenter ensuite progressivement les doses en surveillant le malade jusqu'à atteindre la dose de 0,60 gr. pour la femme et 0,75 gr. pour l'homme. Chez les hommes qui supportent bien le médicament, on peut utiliser la dose de 0,90 gr.

On fera chaque série d'injections telle que la quantité totale d'Ar-sébényl injecté soit de 6 à 7 grammes.

Les injections seront faites à un intervalle de huit jours.

### Présentation :

Boîtes de 1 et 10 ampoules à 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75 et 0,90 gr.

Boîtes de 25 à 50 ampoules } sur demande

Doses de 1,5 - 3 gr., etc.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province



**ARSENO-FER HENRY**

(Flacon de 45 cc.)

Prix : 15 francs.

**Composition :**

Complexe très actif contenant par cc. ou 20 gouttes :

a) Du *Fer Henry* (peptonate ferro-manganeux répondant à 0,01 gr. de fer métal et 0,005 gr. de manganèse métal.b) De l'*arsenic* sous forme de méthylarsinate de soude 0,02 gr.**Indications :**

Dans le traitement de la chlorose, le fer et l'arsenic associés donnent une amélioration beaucoup plus rapide que le seul traitement ferrugineux (expér. Zwetkoff, Clin. Sahlî, à Berne).

**Posologie :**

Adultes : 20 gouttes trois fois par jour aux repas.

Enfants : 1 goutte deux fois par jour par année d'âge.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**ASTHMACIDINE**

(Ampoules) Boîte de 12

**Composition :**

Néo-pituit. Suprarénid. sérum isotonique.

**Indications :**

Crise d'asthme essentiel.

**Doses :**

Une ampoule de 1 cc. Cette dose est ordinairement suffisante pour annihiler l'accès qui cesse très rapidement. Dans le cas contraire, elle peut être renouvelée une heure après l'intervention initiale.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## BERKENDYL

### Composition :

Sodium paratoluène sulfochloramine.  
Dérivé chloré inoffensif et stable pour l'antiseptie suivant les méthodes du D<sup>r</sup> Carrel.

### Indications :

Toutes les applications de l'antiseptie. Antiseptie des plaies.  
Affections buccales, urétrales et vésicales. Hygiène de la femme.

### Posologie :

Instillation continue ou lavage de plaies : 2 à 5 comprimés, par litre d'eau suivant le degré d'infection.  
Pharyngites, angines, abcès dentaires : 1 à 2 comprimés par litre.  
Affections urétrales et vésicales : suivant indications du médecin.

### Présentation :

Tubes de 100 comprimés à 0,25 gr.  
Tubes de 50 comprimés à 0,25 gr.  
Flacons de 25 comprimés à 0,25 gr.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

## **BICHLORYL**

### **Composition :**

Oxychlorure de Bismuth en suspension aqueuse ou huileuse.

Teneur en métal : 80 %.

Peut être prescrit aux frais de l'Etat. (Circularaire du Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène du 22 août 1924.)

### **Indications :**

Syphilis. Pian.

### **Posologie :**

Chaque ampoule renferme 2 cc. de suspension, soit 0,20 gr. de produit actif.

On fera une injection de 0,20 gr. tous les quatre ou tous les six jours suivant les cas, par séries de dix piqûres, séparées par un repos variant de douze jours à six semaines suivant les progrès de la cure.

### **Présentation :**

Boîtes de 12 ampoules de 0,20 gr. du sel (2 cc. de suspension aqueuse).

Boîtes de 12 ampoules de 0,20 gr. du sel (2 cc. de suspension huileuse).

### **UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

**B I D R A T Y L****Composition :**

Hydroxyde de Bismuth en suspension huileuse.

Peut être prescrit aux frais de l'Etat. (Circulaire du Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène du 22 août 1924.)

Teneur en métal : 86 % environ.

**Indications :**

Syphilis. Pian.

**Posologie :**

On fera une injection intramusculaire de 0,30 gr. tous les deux ou tous les quatre jours, suivant les cas, par séries de dix piqûres séparées par dix jours de repos.

**Présentation :**

Boîtes de 12 ampoules de 3 cc. de suspension huileuse (0,30 gr. de produit actif).

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## BIOCALCINE

Réminéralisation de l'organisme. Granulé de sels minéraux, de poudre d'os, d'extraits de thymus, de glandes parathyroïdes et de surrénales.

### Indications :

Grossesse. Convalescence des maladies. Rachitisme. Lymphatisme. Retard de croissance. Carie dentaire. Surmenage. Neurasthénie. Troubles du métabolisme calcique.

### Doses :

1 à 3 cuillerées à café par jour, après repas.

La boîte de 125 gr. : 15 francs.

Laboratoire d'Opothérapie U. T. A.

**ETABLISSEMENTS PAUL THIWISSEN**

13, rue Sainte-Véronique, Liège

Echantillons gratuits sur demande.

## BIORENINE « BIOS »

### Composition :

Principe actif des capsules surrénales, découvert par le savant japonais Takamine, sous le nom d'adrénaline.

### Indications :

Ostéomalacie, rachitisme, asthme, anaphylaxie, intoxications, hémorragie, crises nitritoïdes, vomissements incoercibles de la grossesse; maladies infectieuses, hypotension, chirurgie.

### Mode d'emploi :

5 à 10 gouttes deux à trois fois par jour (flacons de 30, 60, 125 cc. et plus de solution dosée à 1 p. 1000).

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**BIORENINE « BIOS » Injectable**

Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. dosées à 1 milligr.

**Mode d'emploi :**

1 à 2 ampoules par jour, suivant le cas : injections sous-cutanées ou intraveineuses.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

**Pour les**

**Bactériophages « Bios »**

**voir produit 286**

## BIQUINYL 50 %

### Composition :

Iodure double de Bismuth et de Quinine surbismuthé.

Teneur en Bismuth : 50 %.

Peut être prescrit aux frais de l'Etat. (Circulaire du Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène en date du 12 août 1924.)

### Indications :

Syphilis. Hérédo-Syphilis. Cures d'entretien. Pian.

Les manifestations primaires (chancre, adénopathie); secondaires (roséole, plaques muqueuses, cyphilides variées); tertiaires (néoplasmes, ulcérations de la peau, des tissus sous-jacents; tabès, paralysie générale, aortites, etc.) sont nettement arrêtées dans leur évolution dès le début de la cure et rétrocedent sans retard.

En injections intramusculaires ou sous-cutanées.

### Posologie :

Chez l'enfant : on injectera 0,5 à 1 centigramme (soit 0,5/10<sup>cc</sup> à 1/10<sup>cc</sup> de cc. de suspension) par année d'âge.

On pratique une injection tous les deux ou trois jours pendant un mois.

Chez l'adulte : on donnera tous les trois jours une injection de 30 centigrammes (soit 3 cc. de suspension) de façon à atteindre un total de 15 à 20 injections pour une cure.

### Présentation :

Boîtes de 12 ampoules de 3 cc. suspension huileuse (0,30 gr. de sel).

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS BISMOQUINOL « BIOS »

### Composition :

Iodure de quinine et bismuth en suspension aqueuse organo-hépatique à laquelle il doit l'accélération de ses propriétés spirillicides.

### Indications :

Syphilis, période primaire (chancre et adénopathie).  
 Accidents de la syphilis à la période secondaire.  
 Accidents de la syphilis à la période tertiaire.  
 Tabes. Ulcère tropical, affection chronique provoquée, elle aussi, par un spirochète.

### Mode d'emploi :

Traitement d'attaque, injection intramusculaire de 2 cc. et demi tous les quatre jours. La série comporte douze piqûres.

Traitement d'entretien : injection intramusculaire de 2 cc. et demi tous les huit jours, jusqu'à concurrence de douze piqûres.

Enfants : Pour les enfants de 1 à 3 ans, injecter un demi cc. Pour les enfants de 4 à 7 ans, injecter 1 cc. à 1 cc. et demi. Pour les enfants de 8 à 15 ans injecter 1 cc. et demi à 2 cc. Le mode d'emploi peut être modifié selon l'état et la tolérance du sujet.

Présentation : Boîtes de 6 à 12 ampoules de 3 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**  
**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
 11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)



**B I S M U T H 25 (Ampoules)****Composition :**

Iodure double de bismuth et quinine. Chaque ampoule contient 30 cgr. de sel en 3 cc. de suspension huileuse.

**Indications :**

Traitement de la syphilis.

**Doses :**

Traitement d'attaque : deux séries de douze injections de 3 cc. tous les trois ou quatre jours.

Traitement d'entretien : séries de douze injections suivies ou espacées chacune d'un repos d'un mois.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**Par contrat avec la Maison des Médecins, les**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

accordent 15 % de ristourne sur leurs prix courants

## B I S M U T H Y L

### Composition :

Bismuth métallique en suspension dans du sérum glucosé.

Teneur en métal 97 %.

Peut être prescrit aux frais de l'Etat. (Circulaire du Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène du 22 août 1924).

### Indications :

Syphilis-Arséno-résistances. Arséno-récidives.

Syphilis à réaction de B.-W. irréductibles.

Particulièrement indiqué comme cure d'entretien entre deux séries d'injections arsénicales.

### Posologie :

Une dose de 2 cc. est suffisante pour une injection et cette quantité ne doit point être dépassée.

L'on administre tous les cinq jours une injection de 2 cc., soit 0,20 gr. de Bismuthyl jusqu'à atteindre la dose total de 2,50 à 3 gr.

### Présentation :

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. (0,20 gr. de Bismuth à 97 %).

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

## BROMOVALERON HENRY

Prix : 16 fr. 50.

Flacon de 45 cc.

### Composition :

Par 20 gouttes renferme : a) 0,0375 gr. de brome combiné aux peptones trypsique et érepsique; b) 1,66 gr. de valériane fraîche, stabilisée, sans odeur.

### Propriétés :

Sédatif antinerveux, action énergique sur les centres nerveux en diminuant leur excitabilité réflexe.

### Indications :

Celle des bromures, mais plus active qu'eux, à doses moindres sans en avoir les inconvénients.

### Doses :

Adultes : 20 gouttes trois fois par jour (ces doses peuvent être doublées, même quadruplées).

### LABORATOIRES HENRY

Rue de Sclessin, 39, Liège

---

## BROMURE D'ETHYLE MEURICE

### Indications :

Narcose.

### Présentation :

Boîtes de 5 ampoules de 10 grammes.  
 Boîtes de 1 ampoule de 10 grammes.  
 Boîtes de 1 ampoule de 15 grammes.  
 Boîtes de 5 ampoules de 15 grammes.  
 Boîtes de 1 ampoule de 30 grammes.  
 Boîtes de 5 ampoules de 30 grammes.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## BRONCHITOL HENRY

### Composition :

Orthosulfogaïacolate de K. présenté sous deux formes agréables. Remplace la médication gaïacolée et créosotée sans en avoir les inconvénients.

### Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, cupeptique, phagocytogène, orexique.

### Indications :

Affections broncho-pulmonaire, rhumes, bronchites, gripes, tuberculose.

Le Bronchitol Henry existe sous deux formes :

BRONCHITOL SIROP (0,666 gr. d'orthosulfogaïacolate de K. par cuill. à soupe répondant à 0,346 gr. de gaïacol pur).

### Doses :

Adultes : 3 cuill. à soupe par jour .

Enfants de 5 à 10 ans : 3 cuill. à café ; de 10 à 16 ans, 3 cuill. à dessert ; en flacons de 250 cc.

Prix : 16 fr. 50.

BRONCHITOL PASTILLES (0,20 gr. d'orthosulfogaïacolate de K. par pastille).

### Doses :

Adultes : 10 pastilles par jour.

Enfants : 1/2 pastille par année d'âge.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**CARNI-MARSINE (GYNOL)****Composition :**

10 gouttes correspondent à : peptonate de fer, 10 cgr. ; glycérophosphate de soude, 5 cgr. ; sulfate de strychnine, 2/10 mgr. arséniate de potasse, un demi-millgr. ; glycérine, spirit, q. s.

**Indications :**

Reconstituant complet en cas d'asthénie, neurasthénie, tuberculose, chlorose et toutes délébitations organiques.

Médication postgrippale de tout premier ordre. Traitement de consolidation par voie buccale.

**Posologie à partir de trois ans :**

A partir de 3 ans : 5 gouttes matin et soir dans de l'eau sucrée.

Augmenter journellement de 1 goutte matin et soir jusque 10 gouttes, maintenir pendant dix jours deux fois 10 gouttes par jour et puis redescendre graduellement goutte par goutte jusqu'à 5 gouttes.

A partir de 10 ans : 10 gouttes matin et soir dans de l'eau sucrée ; augmenter journellement de 2 gouttes jusque 20 gouttes, maintenir cette dose pendant dix jours et puis redescendre jusque 10 gouttes.

Adultes : de 20, 24, 28 à 40 gouttes matin et soir dans un verre de vin ; maintenir cette dose pendant dix jours et redescendre de 40 à 20 gouttes.

**Prix :**

Prix : 15 francs le flacon.

**LABORATOIRES GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

**CASCARA HENRY**

(Flacon de 45 cc. et 100 cc.)

Prix : 13 et 20 francs.

Laxatif agréable à base de Cascara Sagrada désamarré et de Rhamnus frangula stabilisé, ne produisant ni constipation secondaire, ni nausées, ni coliques.

**Indications :**

Toutes les espèces de constipations : enfants, pendant la grossesse, pendant la lactation, après les opérations abdominales. Ré-éducateur de l'intestin dans la constipation.

**Doses :**

Adultes : 1/2 à 1 cuiller à café (plus si besoin) dans un verre d'eau de préférence après le repas du soir.

Enfants : 4 gouttes par année d'âge et plus si nécessaire.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

Une reliure « R. I. P. R. A. »

éternellement vivra

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

## C H A R D Y L

### Composition :

*Poudre* : acide oxyiodobenzopyridine sulfonique + bicarbonate sodique.

*Pilules* : oxyiodobenzopyridine sulfonate sodique.

Produit pratiquement dénué de toxicité.

### Indications :

Prophylaxie de l'amibiase. Traitement efficace de la dysenterie amibienne.

### Posologie :

*Prophylaxie de l'amibiase* : Prendre 1 gramme de Chardyl par jour (soit 4 pilules de 0,25 gr., soit quatre fois 0,25 gr. de poudre mise en gélules).

*Dysenterie amibienne* :

a) par voie buccale : Prendre trois fois 1 gramme par jour (3 x 4 pilules à 0,25 gr. ou 3 x 4 gélules à 0,25 gr. de poudre) pendant huit jours. Repos de dix à quinze jours. Recommencer une deuxième cure et au besoin une troisième après le même intervalle de repos.

b) par voie rectale (voir notice spéciale).

### Présentation :

Poudre :	Flacons de	10 grammes.
	Flacons de	25 grammes.
	Flacons de	50 grammes.
Pilules :	Flacons de	25 pilules à 0,25 gr.
	Flacons de	50 pilules à 0,25 gr.
	Flacons de	100 pilules à 0,25 gr.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**CHARDYLAX****Composition :**

Oxyiodobenzopyridine sulfonate sodique + podophylline.

**Indications :**

Antiseptique intestinal. Laxatif.  
Ne provoque pas de coliques.

**Posologie :**

Une à deux pilules, le soir, assurent, le lendemain, une ou deux évacuations intestinales aisées.

**Présentation :**

Tubes de 20 pilules à 0,25 gr.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province



## **CHLORASEPTINE OPTIMA**

(Sodium paratoluène sulfochloramine 0,25 par compr.)

Agit à l'instar de la solution de Carrel-Dakin

### **Forme :**

Forme : comprimés dosés à 25 cgr.

### **Indications :**

Antisepsie générale. Affections buccale, urétrales, vésicales. Antisepsie hygiénique. Traitement d'affections septiques.

### **Mode d'emploi :**

Chirurgie générale : 2 à 4 comprimés dans 100 cc. d'eau.

Oculistique : 1 à 2 comprimés pour 100 cc.

Urologie et gynécologie : 2 à 8 comprimés par litre.

Stomatologie : 1 comprimé par verre d'eau.

A dissoudre dans l'eau froide ou légèrement tiède.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## CHLOREMETINE BIOS

### Composition :

Boîtes de 6 ampoules à 2 cc. dosées à 0,04 gr. de Chlorhydrate d'émétine chimiquement pur.

### Indications :

Dysenterie amibienne, kyste amibien (hépatique), hémoptysies, pneumonies, hématuries.

### Mode d'emploi :

Il est recommandé de débiter par des doses assez fortes (0,04) au moins pendant quatre jours. Cesser si l'on constate des accidents soit urticaire, dyspnée, hypotension.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## CHLOROFORME MEURICE

CHIMIQUEMENT PUR

### Indications :

Narcose.

### Présentation :

Boîtes de 1 ampoule de 30 grammes.

Boîtes de 5 ampoules de 30 grammes.

Boîte de 1 ampoule de 50 grammes.

Boîtes de 5 ampoules de 50 grammes.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**CHLORO-MAGNESIUM HENRY**

(Flacon de 45 cc.)

Prix : 12 francs.

Solution titrée de magnésie hallogénée, d'un goût agréable, permettant une cure facile par le chlorure de magnésium suivant les théories du Prof. Delbet.

**Dosage :**

20 gouttes = 0,40 gr. de chlorure de magnésium anhydre.

**Posologie :**

20 gouttes trois fois par jour dans n'importe quel liquide, aux repas.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Selessin, 39, Liège

**CHLORURE D'ETHYLE MEURICE****Indications :**

Anesthésie locale. Anesthésie générale.

**Présentation :** (en ampoules à capillaires)

Boîtes de 12 ampoules de 3 grammes.

Boîtes de 1 à 5 ampoules de 10 grammes. { Ampoules à fermeture

Boîtes de 1 à 5 ampoules de 30 grammes. { à vis

Boîtes de 1 à 5 ampoules de 50 grammes. }

Ces conditionnements existent pour l'anesthésie locale et pour l'anesthésie générale.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**CHOLEDOL (Pilules)**

Nouveau spécifique des maladies du foie et de l'intestin

**Composition :**

Tous les éléments de la bile, enrobés en une substance qui ne se dissout qu'au niveau de l'intestin.

**Indications :**

Lithiase biliaire. Acholie. Constipation chronique. Entérocolite m. m. Ictère par rétention. Fermentations intestinales. Etats dyspeptiques d'origine arthritique.

**Doses :**

4 à 8 pilules par jour; deux après repas.

L'étui de 100 pilules : 18 francs.

Laboratoire d'Opothérapie U. T. A.

**ETABLISSEMENTS PAUL THIWISSEN**

13, rue Sainte-Véronique, Liège

*Echantillons gratuits sur demande*

**CORPS JAUNE BIOS****Composition :**

Flacons de 30 comprimés ou cachets dosés à 10 cgr. d'extrait sec égal à 0 gr. 50 d'organe frais.

Bolte de 10 ampoules de 2 cc. Solution physiologique = à 0,50 cgr. d'organe frais.

**Indications :**

Dysménorrhée continue, menstruation profuse, hémorragie de la puberté et de la ménopause.

**Mode d'emploi :**

2 à 3 comprimés par jour, en injection de 2 à 6 par semaine.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## CORYZOL

### Composition :

Vaccination préventive et curative des infections nazopharyngienne.

Onguent vaccin à base de filtrats de lysas polymicrobiens concentrés, préparés des germes habituels rhino-pharyngiens, soit staphylocoques blancs et dorés, streptocoques V. et hémolytiques, friedlander, pneumocoques, pseudo-diphthériques, micrococcus catarrhalis, etc., additionnés de protéines végétales de pollen, d'extrait surrénal, goménol, eucalyptol et menthol.

### Indications :

Immunsation locale des voies rhino-pharyngiennes, selon les travaux de Grain, traitement du coryza, rhume des foins, pharyngite, angine et toute maladie infectieuse du nez et de la gorge, ozène, coryza des nouveaux-nés.

Il a été prouvé que diverses affections, telles que rhumatisme, infection intestinale ont souvent comme point de départ des infections du nez et de la gorge.

### Mode d'emploi :

Se moucher de façon à débarrasser la muqueuse et introduire trois à quatre fois par jour, gros comme un petit pois d'onguent, dans chaque narine, aspirer lentement en renversant légèrement la tête de façon à ce que les muqueuses s'imprègnent entièrement.

Eviter de se moucher pendant dix minutes.

**A. WARTEL**

1, avenue du Val Fleuri, Uccle.

## **CREOSOFORME LAMBIOTTE Frères**

Combinaison d'aldéhyde formique (4 %) et de créosote (96 %). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

### **Propriétés thérapeutiques :**

Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'aseptie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

### **Indications :**

Plaies, ulcères, brûlures, engelures, fistules, tuberculoses chirurgicales, dermites, gynécologie, hémorroïdes, et toutes autres affections anales, etc.

### **Mode d'emploi :**

Existe sous quatre formes :

- 1° Créosoforme poudre, présenté en flacons poudreux, pour saupoudrage des plaies ;
- 2° Créosoforme-onguent, présenté en tubes étain ;
- 3° Créosoforme-ovules, pour pansements gynécologiques ;
- 4° Créosoforme-suppositoires, un ou deux par jour.

Littérature et échantillons :

**PRODUITS LAMBIOTTE FRERES**

124, avenue Rogier, Bruxelles

## CUPROGYNOL

### Composition :

Comprimés effervescents à 30 cgr. de sulfate de cuivre par comprimé, acide borique, acide tartrique et bicarbonate de soude q. s.

### Indications :

#### Gynécologie.

Métrites. Salpingites. Leucorrhée. Accouchements. Vulvites. Vaginites. Infections puerpérales.

#### Dermatologie.

Plaies infectées. Ulcères. Psoriasis. Furoncles. Panaris.

#### Oto-rhino-laryngologie.

Sinusites.

### Posologie :

#### Gynécologie.

1 à 2 comprimés pour 2 litres d'eau en injections vaginales.

#### Dermatologie.

1 comprimés par litre d'eau en pansements humides ou en bains chauds.

#### Oto-rhino-laryngologie.

1 comprimé pour 2 litres d'eau en lavages.

**LABORATOIRES GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

## CYLODYOL

### Composition :

Chlorure d'Ethyle iodé.

### Indications :

Anesthésie locale et désinfection simultanées par pulvérisation.  
Traumatismes. Petite chirurgie des accidents.

### Avantages :

- 1° Aucune altération possible des tissus cutanés.
- 2° Désinfection des plaies, sans tampons ni autres accessoires par le jet de l'ampoule.
- 3° Anesthésie et antiseptie des plaies pour enlèvement de corps étrangers.
- 4° Conservation indéfinie et inaltérabilité complète.

### Présentation :

Ampoules à capillaire de 10 grammes	}	fermeture à vis
Ampoules à capillaire de 30 grammes		

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province



## DENTALGINE DE MONTREAL

### Composition :

Un cachet contient : diméthyl oxy-quinizine, para-acétophénétidine, amidopyrine aa 25 cgr, chlorhydrate d'éthylmorphine 3 mlgr.

### Indications :

*Maux de dents*, avant ou après les interventions dentaires, pulpites, périostites, périodontites, etc.

*Maux de tête*, y compris les céphalées des surmenés, des nerveux.

*Névralgies* aiguës ou chroniques, névralgies intercostales, lombagos, sciatique, myosites, névralgies rhumatismales, névrites, etc.

*Règles douloureuses* : avant et pendant l'apparition.

*Douleurs* causées par des plaies et toutes douleurs postopératoires.

### Posologie :

Adultes : 1 à 3 cachets par jour en dehors des repas et à une heure d'intervalle avec un demi verre d'eau.

Enfants de 10 à 16 ans : 1 à 2 cachets par jour avec un intervalle d'au moins trois heures.

S'abstenir pour les enfants en-dessous de dix ans.

### Prix :

Prix : 10 francs.

**LABORATOIRES GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

**DIGESTIF HENRY**

(Boîte de 160 gr.)

Prix : 10 francs.

**Composition :**

Papaine; bicarbonate de soude pur ; chlorure de soude ; carbonate de calcium ; magnésie calcinée ; phosphate calcique ; phosphate de soude ; sulfate de soude.

**Mode d'emploi :**

*Hypochlorhydriques* : 1/2 cuill. à café avant les repas.

*Hyperchlorhydriques* : a) 1 cuill. à café directement après les repas en cas de douleurs fortes et répéter s'il y a lieu.

b) Si l'hyperchlorhydrie est bien supportée pendant la première heure, prendre 1 cuill. à café vers la troisième heure de la digestion.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**Demandez le tarif des prix  
courants de reliure aux**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

**DIGISTABILINE (Gouttes)****Composition :**

Alcoolature stabilisée de Digitale, préparation résultant de l'action de l'alcool bouillant sur son propre poids de feuilles de Digitale fraîches.

La Digistabiline gouttes renferme non altéré le complexe glucosidique de la plante fraîche. Les travaux scientifiques récents ont démontré la supériorité de ces préparations stabilisées sur les autres formes galéniques similaires, mais obtenues à partir de feuilles sèches non stabilisées. Les feuilles qui ont servi à la préparation de la Digistabiline gouttes répondent aux conditions de l'essai physiologique telles qu'elles ont été déterminées par le Comité d'Hygiène de la Société des Nations, ce qui donne sécurité parfaite quant à l'activité de cette préparation.

**Doses :**

La Digistabiline gouttes est préparée de telle façon que septante gouttes correspondent à 1 gramme de feuilles de digitale fraîches.

La préparation logée en compte-gouttes peut donc être facilement dosée.

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

## **DIGITALIS PURPUREA** **« OPTIMA »**

(POUDRE) EN FLACONS DE 50 ET 100 GR.

### **Composition :**

Poudre de feuilles de digitale titrée biologiquement par la méthode de Hatcher-Magnus. L'activité de 1 gramme de cette poudre dosée à 10 un. intern. correspond à l'activité de 1 gramme de poudre de digitale standard international.

### **Indications :**

Toutes les indications de la digitale.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**  
78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

---

56

## **DIPLOVACCIN U.T.A. (Ampoules)**

Emulsion de gonocoques polyvalents.

Blennorrhagie aiguë et chronique. Catarrhe utérin ou vaginal, gonococies à foyers fermés, etc.

Une ampoule en injection sous-cutanée tous les deux jours.

Cinq concentrations différentes :

Dosage A = 6.250.000 microbes par cc.

Dosage B = 12.500.000 microbes par cc.

Dosage C = 25.000.000 microbes par cc.

Dosage D = 50.000.000 microbes par cc.

Dosage E = 100.000.000 microbes par cc.

Laboratoire d'Opothérapie U. T. A.

**ETABLISSEMENTS PAUL THIWISSEN**

13, rue Sainte-Véronique, Liège

*Echantillons gratuits sur demande*

**DRAGEES HEPATIQUES****« OPTIMA »**

(FLACONS DE 50)

**Composition :**

Sels biliaires-bold, et pancr.

**Indications :**

Affections du foie.

**Doses :**

Deux dragées trois fois par jour aux repas.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**DRAGEES IODURINE « OPTIMA »**

(FLACONS DE 50)

**Composition :**

Vingt-cinq centigrammes iodure potassique par dragée.

**Indications :**

Myocardites; angines de poitrine, artério-sclérose, anévrismes.

**Doses :**

A prendre au milieu du repas sur l'indication du médecin.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## DUOPANCREINE BIOS

### Composition :

Ferment digestif à base de pancréas total et de duodénum.

### Indications :

Dyspepsie intestinale, entérite mucomembraneuse, constipation, diarrhée, gastro-entérite, lithiase biliaire avec altération du pancréas, diabète, cancer.

### Mode d'emploi :

1 à 2 comprimés à chaque repas.

Boîte de 30 comprimés dragéifiés.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

## DYSPEPTASE « BIOS »

60

### Composition :

Suc gastro-duodéal, spécifique de l'insuffisance digestive.

### Indications :

Insuffisances digestives, hypersécrétion, hypochlorhydrie qui se rencontrent particulièrement chez les tuberculeux chez qui l'anorexie et gastropathie sont communes. Dyspepsie nerveuse, entérite muco-membraneuse, indigestions, vomissement de la grossesse.

### Mode d'emploi :

Adultes : de une à deux cuillers à café dans la boisson, avant ou pendant les repas, suivant le cas.

Enfants : de une demi à une cuiller à café avant chaque prise de repas ou avant chaque tétée.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**EAU FLUOROFORMÉE****Indications :**

Coqueluche.

**Posologie :**

Jusqu'à 2 ans : par gouttes, progressivement, jusqu'à 5 grammes par jour, environ.

De 2 à 4 ans : une demi-cuillerée à café après chaque quinte, maximum : 10 grammes par jour.

Au-dessus de 4 ans : une cuillerée à café après chaque quinte, maximum : 30 grammes par jour.

**Présentation :**

Flacons d'origine de 100 grammes.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province.

**ENDOXIDINA**

(FLACONS DE 100 COMPRIMÉS)

**Composition :**

Extrait des tissus embryonnaires.

**Indications :**

Cure de l'obésité.

**Doses :**

Première semaine 4 c. p. j.

Deuxième semaine 6 c. p. j.

Troisième semaine 8 c. p. j.

Quatrième semaine 10 c. p. j.

(Demander notice spéciale.)

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

63

**ETHER-NARCOSE MEURICE****Indications :**

Anesthésie générale.

**Posologie :**

Suivant les nécessités.

**Présentation :**

Flacons spéciaux de 100 grammes.

Flacons spéciaux de 250 grammes.

Flacons spéciaux de 500 grammes.

Flacons spéciaux de 1000 grammes.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province



## E T H Y L A S E

### Composition :

Solution alcoolique d'orthoformiate triéthylique.

### Indications :

Coqueluche. Toux spasmodiques.

### Posologie :

Enfants de 6 mois à 1 an : 8 à 10 gouttes.	}	(Par prise, à répéter quatre, cinq ou six fois par jour.)
Enfants de 1 à 2 ans : 10 à 15 gouttes.		
Enfants au-dessus de 2 ans : 15 à 30 gouttes.		
Adultes : 30 à 50 gouttes.		

Ces doses peuvent être élevées sans danger.  
La dose pour adultes peut être portée progressivement à 300 gouttes en vingt-quatre heures.

### Présentation :

Flacons compte-gouttes de 15 grammes.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

## EXONERINE (GYNOL)

### Composition :

Gelosa. Bilis-Ext. Lactis ferment. Podophyllum 1 cgr. Saccharum. Amil. Carbo Veget. Tolu q. s. pour 1 comp. dragéfié.

### Indications :

L'Exonérine guérit la constipation, en rétablissant les fonctions naturelles de l'intestin, non pas pour une période passagère, mais par une réelle rééducation.

**Aucune accoutumance.**

### Posologie :

1 à 3 comprimés à chaque repas ou bien 2 à 4 le soir au coucher.

### Prix :

Prix : 15 francs le flacon de 50 comprimés.

### LABORATOIRES GYNOL

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

## EXTRAIT BILIAIRE BIOS

### Composition :

Comprimés pilulaires dosés à 0,10 de bile desséchée purifiée.

### Indications :

Lithiase biliaire, coliques hépatiques, constipation opiniâtre, entérococolite muco-membraneuse.

### Mode d'emploi :

2 à 4 pilules par jour .

Flacon de 50 pilules.

### M. et H. COUTELIER FRÈRES

#### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## EXTRAIT BILIAIRE DE PIGMENTE DE CHOLESTERINE BIOS

### Composition :

Comprimés dragéifiés contenant 20 cgr. de bile sèche privée de pigments et de la cholestérine.

### Indications :

Lithiase biliaire, coliques hépatiques, constipation opiniâtre, entérococolite muco-membraneuse.

### Mode d'emploi :

2 à 4 comprimés par jour.

Flacon de 30 comprimés.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## EXTRAIT CARDIAQUE BIOS

### Composition :

Cachets dosés à 0,50 cgr., soit 2,50 gr. d'organe frais.

Boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

### Indications :

Dégénérescence, myocardique, insuffisance cardiaque postinfectieuse et toxique.

### Mode d'emploi :

2 à 6 par jour.

Injection journalière puis espacer.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**EXTRAIT DE CERVEAU BIOS****Composition :**

Comprimés ou cachets dosés à 0,20 gr. de substances cérébrales égale 1 gr. d'organe frais.

**Indications :**

Neurasthénie, ataxie, chlorose épilepsie, débilité consécutive aux infections, psychonévroses.

**Mode d'emploi :**

2 à 6 par jour.

Flacons de 30 comprimés.

**M. et H. COUTELIER FRERES****Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

**Ses reliures**

**de bibliothèque**

**et de fantaisie**

**Organisation et remise à neuf de bibliothèques**

## EXTRAIT HEPATIQUE « BIOS »

### Composition :

Comprimés ou cachets dosés à 50 mgr. d'extrait hépatique représentant 2,50 gr. d'organes frais.

### Indications :

Cirrhoses, lithiase vésiculaire, diabète par anhépathie, congestion, cancer du foie, lithiase biliaire, arthritisme, hémorragie.

### Mode d'emploi :

2 à 6 comprimés par jour.

### TRAITEMENT DE L'ANEMIE PERNICIEUSE

Nous préparons spécialement pour le traitement de l'anémie pernicieuse, selon la méthode de Whipple, un extrait hépatique résultant de la dessiccation de foies de veaux dans le vide à froid que l'on prescrit sous le nom de *Extrait Hépatique Bios* en poudre.

De façon à éviter les erreurs, prière de bien spécifier « Extrait hépatique en poudre ».

Délivré en flacons de 125 à 250 grammes.

**Nous préparons de même l'EXTRAIT TOTAL D'ESTOMAC DE PORC** délivré sous les mêmes formes.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

## EXTRAIT MAMMAIRE BIOS

### Composition :

Comprimés ou cachets dosés à 0,50 cgr. de glande mammaire égal 2,50 gr. de glande fraîche.

### Indications :

Métrorragie, fibromes utérins, troubles utérins, amaigrissement et troubles nerveux consécutifs à l'hyperovarie.

### Mode d'emploi :

2 à 6 comprimés par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## EXTRAIT DE RATE BIOS

### Composition :

- 1) Cachets dosés à 0,20 d'extrait de rate, soit 1 gramme de glande fraîche.
- 2) Boîte de 10 ampoules de 2 cc. extrait hydro-soluble.

### Indications :

Anémie, hémorragie, paludisme. Eczéma. Urticaire.

### Mode d'emploi :

2 à 3 cachets par jour.  
Une injection par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## EXTRAIT DE REIN BIOS

### Composition :

Cachets dosés à 0,20 cgr. d'extrait de rein, soit 1 gramme de glande fraîche.

Boîte de 10 ampoules de 2 cc.

### Indications :

Urémie (augmente la diurèse), néphrite aiguë, chronique consécutive à la typhoïde, scarlatine, rougeole et diphtérie, néphrite tuberculeuse (albuminurie).

### Mode d'emploi :

2 à 6 par jour.

Injection journalière.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

Toutes les reliures aux

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

**EXTRAITS**  
**PLURIGLANDULAIRES BIOS**  
**FORMES PLURIGLANDULAIRES DIVERSES**

*Nota.* — Pour les prescriptions, indiquer soit la formule, soit simplement les initiales; mais l'une ou l'autre avec la lettre A, B, C, etc., en stipulant la marque « BIOS ».

**A****Composition :**

Surrénale 0,10 cgr., hypophyse 0,10 gr.

**Indications :**

Asthme, ins. surrénale, maladie d'addison, asthénies nerveuses, maladie de basedow, tuberculose.

**Mode d'emploi :**

2 cachets par jour.

**B****Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., hypophyse 0,10 gr.

**Indications :**

Syndrome adipo-génital, infantilisme, myxœdème.

**Mode d'emploi :**

1 ou 2 cachets par jour.

**C****Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., surrénale 0,15 cgr.

**Indications :**

Insuffisance thyroïdienne avec hypotension artérielle, dystrophies de l'enfance et de l'adolescence, troubles cutanés d'origine endocrinienne, infantilisme, etc.

**Mode d'emploi :**

3 à 4 cachets par jour.

**D****Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., hypophyse 0,10 ; surrénale 0,10.



**Indications :**

Insuffisance pluriglandulaire, obésité, infantilisme, syndrome adipo-génital de l'enfant et de l'adulte.

**Mode d'emploi :**

1 à 2 cachets par jour.

**E****Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., surrénale 0,10 gr., ovaire 0,10 gr.

**Indications :**

Troubles de la ménopause, insuffisance ovarienne postopératoire, états dépressifs d'origine ovarienne, vomissements incoercibles de la grossesse, pseudomyxœdème et hypotension.

**Mode d'emploi :**

2 à 4 cachets par jour.

**F****Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., surrénale 0,10 gr., orchitique 0,10 gr.

**Indications :**

Infantilisme masculin, sénilité précoce avec féminisme et hypotension.

**Mode d'emploi :**

1 à 2 cachets par jour.

**Composition :**

Thyroïde 0,05 cgr., ovarine 0,20 gr. (voir Thyrovarine).

**Indications :**

Insuffisance thyro-ovarienne dans les troubles du myxœdème qui accompagne la ménopause compliquée d'insuffisance thyroïdienne, obésité, asthme.

**G****Composition :**

Surrénale 0,10 gr., ovaire 0,10 gr.

**Indications :**

Insuffisance ovarienne avec asthénie, troubles de la puberté, vomissements incoercibles de la grossesse, sénilité précoce.

**Mode d'emploi :**

2 à 4 cachets par jour.

## H

### **Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., orchitique 0,20 cgr.

### **Indications :**

Infantilisme masculin, certains myxœdèmes infantilisme tardif de l'adulte.

### **Mode d'emploi :**

2 à 4 cachets par jour.

## I

### **Composition :**

Surrénale 0,10 gr., orchitique 0,20 gr.

### **Indications :**

Asthénie, insuffisance testiculaire, troubles de la puberté, certains infantilismes, sénilité précoce.

### **Mode d'emploi :**

2 à 4 cachets par jour.

## J

### **Composition :**

Hypophyse 0,10 cgr., orchitique 0,20 cgr.

### **Indications :**

Infantilisme masculin, dystrophie des adolescents, infantilisme de l'adulte.

### **Mode d'emploi :**

1 à 3 cachets par jour.

## K

### **Composition :**

Hypophyse 0,10 cgr., ovaire 0,20 gr.

### **Indications :**

Syndrome adipo-génital, aménorrhée, infantilisme de l'adulte.

### **Mode d'emploi :**

1 à 2 cachets par jour.

## L

### **Composition :**

Thyroïde 0,025 gr., hypophyse 0,05 cgr., ovaire 0,15 gr.

### **Indications :**

Troubles de la ménopause avec hypertension, syndrome adipo-génital.

### **Mode d'emploi :**

1 à 2 cachets par jour.

## M

### **Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., hypophyse 0,05 cgr., orchitique 0,20 cgr.

### **Indications :**

Syndromes adipo-génitaux, infantilisme masculin.

### **Mode d'emploi :**

1 à 2 cachets par jour.

## N

### **Composition :**

Surrénale 0,10 gr., hypophyse 0,05 cgr., ovaire 0,10 gr.

### **Indications :**

Syndrome adipo-génital, troubles de la puberté et de la ménopause, aménorrhée.

### **Mode d'emploi :**

1 à 2 cachets par jour.

## O

### **Composition :**

Surrénale 0,10 cgr., hypophyse 0,05 cgr., orchitique 0,10 gr.

### **Indications :**

Syndrome adipo-génital avec asthénie troubles de la puberté, dystrophie des adolescents, infantilisme de l'adulte.

### **Mode d'emploi :**

2 à 3 cachets par jour.

## P

### **Composition :**

Mammaire 0,25 cgr., placenta 0,25 cgr.

### **Indications :**

Galactogène, insuffisance fonctionnelle de la glande mammaire.

### **Mode d'emploi :**

2 à 6 cachets par jour.

## Q

### **Composition :**

Ovaires 0,20 cgr., mammaire 0,20 cgr.

### **Indications :**

Infantilisme féminin, aménorrhée, hypogalactie des nourrices, obésité ovarienne, troubles de la ménopause.

### **Mode d'emploi :**

1 à 2 cachets par jour.

## R

### **Composition :**

Médullaire 0,20 cgr. ; splénique 0,20 cgr.

### **Indications :**

Paludisme, maladies infectieuses, anémie, tuberculose, rachitisme.

### **Mode d'emploi :**

2 à 4 cachets par jour.

## S

### **Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., hypophyse 0,025 cgr., surrénale 0,10 gr., ovaire 0,10 gr.

### **Indications :**

Anémie, chlorose scrofuleuse, rachitisme, retard de formation et de développement corporel, retard congénital des règles, chétivisme, miévrerie, prètuberculose infantilisme, retard intellectuel.

### **Mode d'emploi :**

2 à 4 par jour et voir Hormoglandines F.

## T

### **Composition :**

Thyroïde 0,025 cgr., hypophyse 0,025 cgr., surrénale 0,10 cgr., orchitique 0,10 cgr.

### **Indications :**

Anémie, chlorose, scrofuleuse rachitisme, retard de formation et de développement corporel, retard congénital des règles, chétivisme, miévrerie, prètuberculose, infantilisme, retard intellectuel.

### **Mode d'emploi :**

2 à 4 par jour et voir Hormoglandines M.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**EXTRAIT SURRENAL MEURICE****Composition :**

Solution titrée à 1/1000<sup>e</sup>.

Principe actif purissime et stable de la glande adrénale.

**Indications :**

Vaso-constricteur. Antitoxique. Médication antichoc. Hémostatique. Hypertension.

**Posologie :**

Par dix ou vingt gouttes à la fois, suivant les besoins.

Injections hypodermiques. (Voir notice spéciale.)

**Présentation :**

Flacons compte-gouttes de 10 grammes.

Ampoules compte-gouttes brevetées de 25 grammes.

Flacons de 50 grammes.

Boîtes de 12 ampoules de 1 cc.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

**EXTRAIT DE THYMUS BIOS****Composition :**

Cachets dosés à 0,20 cgr. de glande sèche, soit 1 gramme d'organe frais.

Ampoules injectables sur prescription.

**Indications :**

Rachitisme, retard de croissance, débilité congénitale, goitre exophtalmique, antagoniste de la thyroïde.

**Mode d'emploi :**

2 à 4 cachets par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

---

**La reliure et la brochure d'art**

doivent être confiées aux

**ETABLISSEMENTS R. I. P. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

**FER HENRY**

(Flacon de 45 cc.)

Prix : 15 francs.

Peptonate ferro-manganique en gouttes concentrées, ne constituant pas.

**Dosage :**

Par cc. ou par 20 gouttes :

- a) Peptonate de fer d'origine trypsique et érepsique (0,01 gr. fer métal) ;
- b) Peptonate de manganèse trypsique et érepsique (0,005 gr. manganèse métal).

L'association du manganèse au fer (le manganèse étant un catalyseur de premier ordre, permettant au fer de produire le maximum de son effet dans le minimum de temps) donne au Fer Henry une action plus rapide et un effet plus marqué qu'avec les autres préparations martiales.

**Doses :**

Adultes : 25 gouttes et plus (double ou triple) trois fois par jour dans de l'eau.

Enfants : 3 gouttes par année d'âge, trois fois par jour.

**LABORATOIRES HENRY**  
Rue de Sclessin, 39, Liège

**LES FILTRATS DE LYSAS  
MICROBIENS « BIOS »**

78

**Bouillon filtrat polymicrobien**, formule Delbet.

**Composition :**

Filtrat de Lysas polymicrobiens strepto staphylo pyocanique, etc.  
Boîtes de 3 à 6 ampoules de 2 cc. injectables.

**Indications :**

Septicémie, infection puerpérale, furonculose, anthrax, broncho-pneumonie, etc.

**Mode d'emploi :**

Injection d'un demi à deux cc. selon le cas et la gravité une à six injections par semaine.

**M. et H. COUDELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. 15,49,30)

---

**Par contrat avec la Maison des Médecins, les**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

accordent 15 % de ristourne sur leurs prix courants



## FORCHINYL

### Composition :

Formiate basique de quinine + carbamate d'éthyle.

### Indications :

Tous les états paludéens (même la cachexie palustre). Grippe. Angines. Vertige de Ménière. Algies diverses. Céphalées. Hyperthermies.

### Posologie :

*Paludisme.* — Adultes : pendant quatre jours, injecter deux ampoules de 0,50 gr. par jour ; puis, après six jours de repos, une ampoule de 0,50 gr. pendant deux jours. Si la fièvre tombe, pratiquer encore quatre à six injections semblables à raison d'une tous les deux jours et reprendre la cure dès qu'un accès fébrile s'annonce par les frissons et la sensation de froid précurseurs.

Enfants : moins de 2 ans : 10 à 20 cgr. ; de 2 à 6 ans : 20 à 30 cgr. ; de 6 à 12 ans : 40 à 70 cgr. ; de 12 à 15 ans : 50 cgr. à 1 gr.

En deux fois par vingt-quatre heures, en suivant le cycle d'alternances indiquées pour les adultes.

*Autres indications :* 0,25 gr. à 1 gramme par jour, en une à trois injections, suivant les cas.

### Présentation :

Boîtes de 12 ampoules contenant 0,25 gr. de formiate pour 1 cc.

Boîtes de 12 ampoules contenant 0,50 gr. de formiate pour 2 cc.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**FORMETINE OPTIMA**

(COMPRIMES) EN BOITE

**Composition :**

Cinquante centigrammes hexam.-tétramine à l'état de pureté absolue par compr.

Puissant dissolvant de l'acide urique.

**Indications :**

Pyérites, cystites, cholécystites, entérocolite, septicémie, toutes les infections sanguines se localisant sur n'importe quel organe.

**Doses :**

3 à 6 comprimés en vingt-quatre heures à prendre une demi-heure avant les repas dans 200 grammes d'eau.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

81

**FULGUROL**

Emulsion stable de paraffine et d'agar-agar avec 0,05 gr. de phé-nolphthaléine par cuillerée à café.

Le *Fulgurol* axatif agissant sans coliques, sans troubles, sans accoutumance.

**Indications :**

Grossesses, constipations, suite de couches, convalescences chirurgicales, stases intestinales, hémorroïdes, affections gynécologiques, constipations opiniâtres, etc.

Le *Fulgurol* est un vrai rééducateur intestinal.

**Mode d'emploi :** (doses moyennes)

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour (au coucher et au lever).

Enfants : 2 cuillerées à café par jour (au coucher et au lever).

**LABORATOIRE FULGUR**

80, avenue d'Amérique, Anvers

## **G A I A T A S E**

### **Composition :**

Orthosulfogaïcolate de potasse chimiquement pur.

Teneur en gaïacol : 52 %.

### **Indications :**

Tuberculose pulmonaire, laryngée. Tuberculose ganglionnaire.  
Bronchite aiguë et chronique (suites de coqueluche, par exemple).

### **Posologie :**

Comprimés à 0,50 gr. : 3 à 6 comprimés par jour, à faire dissoudre de préférence dans un liquide tiède.

### **Présentation :**

Flacons de 25 comprimés à 0,50 gr.

### **UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'aldéhyde formique.

### Propriétés thérapeutiques :

Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

### Indications :

- 1° Prophylaxie des maladies infectieuses ;
- 2° Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ;
- 3° Hygiène de la voix.

### Mode d'emploi :

Une pastille quatre à cinq fois par jour et, au besoin, toutes les heures ou demi heure. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Littérature et échantillons :

**PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES**

124, avenue Rogier, Bruxelles

**GASTRYL**

Tablettes alcalino-bismuthées anti-acides  
en flacon de poche de 100 tablettes

**Indications :**

Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides  
Ulcères de l'estomac.

**PANSEMENT GASTRIQUE****Mode d'emploi :**

Après le repas ou au moment de la douleur, croquer trois ou  
quatre tablettes.

Prix : 10 francs.

Concessionnaire pour la Belgique et la Colonie :

**G. VAN HASSELT**

155, avenue Orban Van Volxem, Stockel-Bruxelles

---

**GLYCERO-TRIBROMURINE**

« OPTIMA »

(Flac. gran. sucré)

**Composition :**

Les 3 bromures à 20 mgr. par c. à c. benz., natr. glyc. phos. cal.

**Indications :**

Névrose, migraine, insomnies, chorée, hypocondrie, etc.

**Doses :**

2 à 4 c. à c. par jour et plus.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**GLYCYL****Composition :**

Ortho-oxybenzoate du propane triol.

**Indications :**

Polyarthrite rhumatismale aiguë, subaiguë et chronique. Rhumatisme musculaire. Lumbago. Névralgie. Torticolis rhumatismaux.

**Mode d'emploi :**

Frictions légères renouvelées deux ou trois fois par jour.

Il est indispensable de varier l'endroit frictionné de façon à revenir au point initial après deux jours.

La partie malade sera légèrement recouverte d'un enveloppement de flanelle.

**Présentation :**

Flacons d'origine de 50 grammes.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## COLARSYL

### Composition :

Oxyactéylaminophénylarsinate de diéthylamine.

### Indications :

Syphilis. Traitements d'attaque, d'entretien, d'épreuve. Hérédo-Syphilis. Pian.

### Posologie :

Injections sous-cutanées hebdomadaires de 4 ou 5 cc., suivant la corpulence ou la santé générale du sujet.

La dose totale d'une série d'injections doit être d'environ 10 gr. du produit actif (soit donc seize injections de 3 cc.; douze injections de 4 cc. ou dix injections de 5 cc.).

Un mois de repos sera intercalé entre deux séries de piqûres.

### Présentation :

Boîtes de 10 ampoules de 3 cc. chacune, contenant 236 milligr. de produit actif par cc., soit 0,05 gr. d'arsenic.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

## G O L Y G O L

### Composition :

Poudre renfermant des ferments lactiques sélectionnés : streptobacillus et diplococcus Lebevis en culture symbiotique.  
(Méthode Van Goidsenhoven et Deperdussin.)

### Indications :

- 1° Traumatismes infectés. Eschares cutanées, ulcères variqueux, brûlures, plaies atones.
- 2° Traitement des vulvo-vaginites et des métrites.

### Mode d'emploi :

1° Pour les lésions de la peau : Laver soigneusement une ou deux fois par jour, au sérum physiologique stérile et tiède, la surface infectée. Tamponner à la gaze stérile. Saupoudrer ou insuffler la poudre Golygol sur toute cette surface et en bonne quantité.

Protéger d'une feuille de gaze stérile, d'ouate et d'une bande. Continuer jusqu'à guérison.

Dans les cas de plaies atones ou de brûlures, on appliquera, après avoir saupoudré de poudre, un enveloppement humide tiède (38°) au sérum stérile que l'on renouvellera toutes les trois heures en saupoudrant chaque fois un peu de nouvelle poudre.

2° Traitement gynécologique : Faire une injection vaginale de 2 à 3 litres à l'eau stérilisée chaude (éventuellement lactosée). Ensuite insuffler dans le vagin et sur le col, au moyen d'un insufflateur bien propre, de la poudre Golygol.

Répéter le traitement une ou deux fois par jour, si possible.

### Présentation :

Flacons de 50 grammes de poudre.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province



**G O Y L****Composition :**

Acide paraoxy-métaacétylamino phénylarsinique.

Thérapeutique arsénicale *per os*.

**Indications :**

Syphilis. Pian. Troubles intestinaux relevant de parasites divers (Lambliæ, Balantidium, Blastocystis). Dysenterie amibienne. Paludisme. Anémies.

**Posologie :**

*Syphilis* : 3 à 4 comprimés par jour, doses que l'on peut continuer pendant un mois, avec le repos d'usage dans les cures arsenicales (de 3 en 3 jours).

*Pian* : 4 comprimés par jour pendant huit jours, puis trois jours de repos et reprise de la cure.

*Troubles intestinaux dus à des parasites* : 2 ou 3 comprimés par jour durant une semaine.

*Dysenterie amibienne* : 2 à 3 comprimés pendant dix jours, ou 1 comprimé pendant trois semaines. Cures à répéter.

*Paludisme* : 4 comprimés par jour, pendant trois jours ; à répéter après un intervalle de trois jours.

*Anémies* : 2 comprimés pris avant ou pendant les repas, du midi et du soir pendant dix jours.

**Présentation :**

Flacons de 28 comprimés à 0,25 gr.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## GOYL INFANTILE

### Composition :

Acide paraoxy-méta-acétylamino-phénylarsinique.  
Thérapeutique arsénicale *per os*.

### Indications :

Hérédo-Syphilis. Pian.

### Posologie :

Enfant de moins d'un an : 5 à 8 ou 10 ctgr. par jour pendant trois à six jours avec interruptions de deux à trois jours jusqu'à résultat clinique.

Enfants de plus d'un an : On augmente cette dose de 5 ctgr. par jour et par année d'âge.

### Présentation :

Flacons de 200 comprimés à 0,01 gr.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**GRANULES OPTIMA****ALOINE A 4 CGR. « OPTIMA »****Indications :**

Constipation, congestion du foie.

**Doses :**

Laxatif : 1 à 2 grammes le matin ou le soir.

Purgatif : 3 à 4 grammes.

**BOLDINE A 1 MGR. « OPTIMA »****Indications :**

Congestion et coliques hépatiques, calculs, ictères, lithiase biliaire.

**Doses :**

3 à 6 gran. par jour en trois fois, à prendre une demi-heure avant les repas.

**COLCHICINE A 1 MGR. « OPTIMA »****Indications :**

Médication anti-goutteuse.

**Doses :**

Un gran. tous les quarts d'heure jusqu'à concurrence de 4 gran. L'action prend fin environ six heures après cette médication.

**DIGITALINE A 1/5 DE MGR. « OPTIMA »****Indications :**

Endocardite, œdème, asystolies, hyposystolies, artério-sclérose.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## GRANULES OPTIMA (Suite)

95

### DIGITALINE A 1/10 DE MGR. « OPTIMA »

#### Indications :

Endocardite, œdème, asystolies, hyposystolies, artério-sclérose.

---

96

### HYDRASTININE A 2 MGR. « OPTIMA »

#### Indications :

Menstruations trop abondantes, hémorragies utérines, hémorroïdes, fluentes ou sèches, hémoptysies, hématoméses, etc.

#### Doses :

3 à 6 gran. par jour suivant l'indication du médecin.

---

97

### HYOSCIAMINE A 1 MGR. « OPTIMA »

#### Indications :

Chorée ; paralysie agitante.

---

98

### SPARTEINE A 2 CGR. « OPTIMA »

#### Indications :

Péricardite, dyspnée, asystolie, palpitations.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## GRAUMANYL

### Composition :

Ethylesters de l'huile de Chaulmoogra.

### Indications :

Lèpre.

### Posologie :

Injections intramusculaires.

On débute par 1 ou 2 cc. suivant la tolérance et l'état du malade, puis on augmente de 1 cc. toutes les quatre injections jusqu'à la dose maxima de 5 à 6 cc. qu'on maintient pendant trois mois. On laisse ensuite le malade au repos, pendant un mois, puis on recommence en injectant 3 cc. d'emblée et ainsi de suite. On estime la durée minima du traitement à deux ans.

### Présentation :

Boîtes de 10 ampoules de 1 cc.

Boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Ampoules spéciales brevetées de 150 cc.

En vrac, sur demande.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## **H E L B A (Sirop)**

Tonique à base d'extrait fluide de *Fénu grec* de méthylarsinate de soude, de sirop de cochléaire, de sirop iodo-tannique phosphaté et d'extrait de cola.

### **Indications :**

Tous les amaigrissements et toutes les dépressions, toutes les asthénies et anorexies, toutes les carences d'énergie vitale ; rachitisme, scrofuleuse, paraspecificité.

### **Doses :**

Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour (avant les repas).

Enfants : 3 cuillerées à café par jour (avant les repas).

### **LABORATOIRE FULGUR**

80, avenue d'Amérique, Anvers

---

**Une reliure « R. I. P. R. A. »**

**éternellement vivra**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

## HEMATEOL BIOS

### OPOTHERAPIE HEMATIQUE

#### Composition :

Sirop de sang vivant total hémopoïétique, de poulains et jeunes taureaux, eugénique, reconstituant, antihémorragique.

#### Indications :

Remède spécifique, non seulement des anémies et des chloroses, mais aussi des défauts de croissance, des troubles de développement, des convalescences de maladies. Les hémorragies opératoires ou spontanées, l'épuisement physique et moral consécutifs à la fatigue au surmenage, à la vieillesse.

#### Mode d'emploi :

*Hématéol Sirop* agréablement aromatisé, se prend à la dose de 1 à 3 cuillères à soupe par jour.

*Hématéol Sérum* en ampoules de 10 cc. à prendre à la dose de 1 à 2 par jour.

*Hématéol* injectable en ampoules de 1 à 2 cc.

#### Avis important :

L'Hématéol sirop doit également son action dans l'anémie pernicieuse et la tuberculose à l'adjonction d'extrait splénique.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**HEMOFERRINE OPTIMA (Elixir)****OPOTHERAPIE HEMATIQUE****Composition :**

Principe albumino-ferrugineux renfermant sous une forme concentrée outre la totalité du fer, les albumines contenues dans le sang.

Bien tolérée par l'estomac et rapidement absorbée par l'intestin sans provoquer de gastralgies, de constipation ou de congestion générale. Agréable au goût.

**Indications :**

Chloro-anémie, anémie pernicieuse, leucémie, cachexie, affections du système nerveux, éréthisme nerveux spécial des personnes faibles, anémiées.

**Doses :**

Adultes : 2 à 3 c. à s. par jour.

Enfants : 2 à 3 c. à c. par jour, une demi-heure avant le repas.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles



**HEMOPOÏNE DU D<sup>r</sup> SCHOL****Composition et présentation :**

*Sirop* de sang hémostatique à concentration hématique.

Flacon de 300 grammes.

*Sérum hémostatique frais de cheval.*

Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Boîte de 8 ampoules de 2 cc. pour choc thérapeutique.

**Indications :**

Opothérapie hématique de toutes les anémies, convalescences, déchéances organiques, croissances difficiles, rachitisme.

Le sérum peut en outre être employé comme agent leucocytaire intense en pansement (brûlures, ulcères, etc.), comme agent d'hémostase et comme agent producteur du choc thérapeutique.

**INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE DE GEMBLoux**

## HEPARBILINE

(Cholagogue complet)

Forme : granulé soluble et aromatisé en flacon.

### Composition :

Sulfate de magnésie, peptone, agissant sur l'excrétion biliaire ; bile, Boldo, agissant sur la sécrétion biliaire.

*Propriétés thérapeutiques* : cholagogue complet, efficace, à base de substances cholécysto-kinétiques et cholérétiques. Agit sur l'excrétion et la sécrétion biliaire.

### Indications :

Toutes les affections du foie et des voies biliaires (ictères, cholécystites, lithiase biliaire, engorgement du foie et de la vésicule biliaire). Inappétence, migraine, urticaire, affections dermatologiques, certaines formes d'asthme, fatigue générale, etc.

### Doses :

Le matin à jeûn, une demi-heure avant de manger, deux cuillerées à café dans un verre d'eau tiède.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**M E D I C A T I O N**  
**P L U R I G L A N D U L A I R E**  
**H O R M O G L A N D I N E S B I O S**

**H O R M O G L A N D I N E F**

**Composition :**

Thyroïde 0,025; surrénale 0,05; hypophyse 0,025; ovaire 0,05; foie 0,10; lactate de fer 0,02; bioxyde de manganèse 0,01.

**H O R M O G L A N D I N E M**

**Composition :**

Même formule à base d'extrait testiculaire.

**Indications :**

Les Hormoglandines par les glandes endocrines apportent les déclencheurs de la puberté, de la santé et renforcent les défenses de l'organisme. Par le fer, elles enrichissent le sang et le manganèse agit comme vecteur d'oxygène.

Anémie, chlorose, scrofule, retard de formation et de développement corporel, retard congénital des règles, chétivisme, pré-tuberculose, infantilisme, retard intellectuel.

*Les Hormoglandines M.* sont préconisées pour le sexe masculin, dans toutes les indications ci-dessus et chez les adultes dans l'asthénie, le surmenage intellectuel, la sénilité précoce et l'impuissance.

**Mode d'emploi :**

Enfant de dix à quatorze ans, deux à quatre par jour. Adulte, de deux à six par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
 11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## HORMOPITUINE BIOS

### Composition :

Extrait hydro-soluble du *lobe postérieur de l'hypophyse* titré physiologiquement.

Boîte de 3 et 6 ampoules de 1 cc.

### Indications :

Comme stimulant dans l'accouchement, hémorragie utérine, affections cardio-vasculaires, tachycardie des basedowiens, asthme, la fièvre des foins, hémoptysie, hémorragie.

### Mode d'emploi :

Un demi à deux cc., selon le cas en injections sous-cutanées ou intraveineuses.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

## ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

BRUXELLES (Tél. 48.35.31)

Ses reliures

de bibliothèque

et de fantaisie

Organisation et remise à neuf de bibliothèques

## **HORMOVÉININE « BIOS »**

### **TRAITEMENT DES ETATS VARIQUEUX PAR L'OPOTHERAPIE ASSOCIEE**

#### **Composition :**

**Hormovéinine F :** Hypophyse 0,025; thyroïde 0,025; surrénale 0,05; ovaire 0,10; hamamélis 0,10; hydrastis 0,05; marron d'Inde 0,05, usage féminin.

**Hormovéinine M :** Hypophyse 0,025; thyroïde 0,025; surrénale 0,05; orchitique 0,10; prostatine 0,10; hamamélis 0,10; hydrastis 0,05; marron d'Inde 0,05, usage masculin.

#### **Indications :**

Employé couramment dans la thérapeutique du traitement des varices, hémorroïdes, phlébites, dans les accidents dus aux états variqueux se manifestant souvent à l'âge de la ménopause, autrement dit au retour d'âge.

#### **Mode d'emploi :**

2 à 4 comprimés par jour et cela au moment des repas.  
Flacon de 30 comprimés.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**HYPERSAN****Composition :**

Extraits fluides de gui, grataegus, stigmates de maïs et cascara.

**Indications :**

Dypertension sous toutes les formes. Artério-sclérose, obésité, ménopause, néphrites.

**Doses :**

Trente gouttes trois fois par jour.

Préparé dans les Laboratoires de la  
**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**  
 -12, rue du Téléphone, Bruxelles

---

**HYPHYPSE BIOS****Composition :**

Comprimés ou cachets dosés à 10 cgr. de lobe antérieur desséché = 50 cgr. de glande fraîche.

**Indications :**

L'insuffisance du lobe antérieur de l'Hypophyse entraîne l'infantilisme, la taille reste petite et les formes gardent des proportions enfantines.

**Mode d'emploi :**

2 à 3 comprimés ou cachets par jour.

Flacon de 30 comprimés.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**HYPOPHYSE BIOS (Lobe antérieur)****Composition :**

1° Comprimés ou cachets dosés à 10 cgr. de lobe antérieur desséché dans le vide représentant 50 cgr. de la glande fraîche.

2° Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. de soluté physiologique préparé selon Evans et Long, représentant 1 gramme de glande fraîche.

**Indications :**

L'insuffisance du lobe antérieur de l'hypophyse entraîne l'infantilisme, l'arrêt de croissance. Cet hormone est préconisée comme stimulant du développement du corps. Les travaux de Zoudek ont prouvé que le lobe antérieur de l'hypophyse déclenche le développement rapide des glandes sexuelles.

**Mode d'emploi :**

Deux à trois comprimés ou cachets par jour.

Injection : de deux à trois par semaine.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**HYPOPHYSE TOTALE BIOS****Composition :**

1° Flacons de 30 comprimés dosés à 10 cgr. de glandes desséchées représentant 50 cgr. de l'organe frais.

2° Boîtes de 10 ampoules de 1 cc. solution physiologique, représentant les principes actifs de 1 gramme de glande fraîche.

**Indications :**

Dystrophie adipo-génitale, hypotension, tachycardie, sudation profuse, asthénie, troubles de nutrition, insomnie, troubles de croissance. Son action sur la sécrétion thyroïdienne l'a fait préconiser par Hertoghe dans le traitement du goitre exophtalmique.

**Mode d'emploi :**

Deux à quatre comprimés par jour.

Deux à six injections par semaine.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## HYPOTENCRINE BIOS

### Composition :

Extrait pancréatique hypotenseur physiologiquement dosé, préparé d'après les travaux de P. Gley et Kisthinios, en ampoules de 2 cc.

### Indications :

Dans tous les états d'hypertension, angine de poitrine, ulcères de l'estomac, etc.

### Mode d'emploi :

Débuter par 1 cc., vérifier la tension et augmenter la dose jusqu'à 2 cc.

2 à 6 ampoules par semaine selon le cas. (Voir aussi Anabolin.)

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## IDEOLAXINE OPTIMA

### Composition :

Paraffine liquide chimique pure, aromatisée, incolore, inodore, insipide.

### Indications :

Lubrifiant, constipation, entérites chroniques, intoxications intestinales, entéro-colite muco-membraneuse, appendicite chronique, stase intestinale, hémorroïdes.

### Doses :

Enfants : 2 c. à c. par jour, matin et soir.

Adultes : 2 c. à s. par jour, matin et soir.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles



## IMMUNO-ANTIVIRUS STREPTOCOCCIQUE

114

### Indications :

Arthrites a streptocoques, pleurésies a streptocoques, suppurations a streptocoques. Erysipèle. (Ampoules de 10 cc.) Fièvre puerpérale. (Ampoules de 25 cc.)

### Présentation :

En ampoules de 10 cc. et 25 cc.

### Mode d'emploi :

Suivant les cas spéciaux, suivre les indications de la notice jointe aux ampoules.

*N. B.* — Les ampoules de 25 cc. renferment un antivirus préparé spécialement pour lutter contre des souches de streptocoques d'origine puerpérale.

Les ampoules de 10 cc. renferment un antivirus préparé contre des souches de streptocoques d'érysipèle, de pleurésies et de suppurations streptococciques.

---

## IMMUNO-ANTIVIRUS COLIBACILLAIRE

115

### Indications :

Cystites.

### Présentation :

En ampoules de 25 cc.

### Mode d'emploi :

Injection quotidienne intravésicale, du contenu d'une ou deux ampoules.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**IMMUNO-ANTIVIRUS**  
**ASSOCIATION Bac. PYOCYANIQUE**  
**COLI-STREPTO-STAPHYLOCOCCIQUE**

**Indications :**

Pour plaies et brûlures suppurées.

**Présentation :**

En ampoules de 10 cc.

**Mode d'emploi :**

En pansements humides.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**  
 Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**  
 12, rue du Téléphone, Bruxelles

---

**IMMUNO-ANTIVIRUS**  
**TUBERCULEUX**

**Indications :**

Lupus. Ostéites tuberculeuses ouvertes, écrouelles.

**Présentation :**

En ampoules de 10 cc.

**Mode d'emploi :**

Suivant les cas spéciaux suivre les indications de la notice jointe aux ampoules.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**  
 Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**  
 12, rue du Téléphone, Bruxelles

## IMMUNO-ANTIVIRUS GRIPPAL

### Indications :

Infection grippale.

### Présentation :

En ampoules de 10 cc.

### Mode d'emploi :

En vaporisations ou en instillations dans les fosses nasales et l'arrière-gorge.

### LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

---

## IMMUNO-ANTIVIRUS CHARBONNEUX

### Indications :

Pustules malignes.

### Présentation :

En ampoules de 10 cc.

### Mode d'emploi :

Pansements humides.

### LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**IMMUNO-ANTIVIRUS  
PNEUMO-STAPHYLOCOCCIQUE**

**Indications :**

Conjonctivites, blépharites, dacryocystites.

**Présentation :**

En ampoules de 10 cc.

**Mode d'emploi :**

Au moyen d'ouate imbibée d'antivirus tamponner les paupières et en mettre quelques gouttes dans le coin des yeux. Pansements humides nocturnes à l'antivirus.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

---

**IMMUNO-ANTIVIRUS  
STAPHYLOCOCCIQUE**

**Indications :**

Infections à staphylocoques, furoncles, anthrax, panaris, sycosis, furonculose du conduit auditif, blépharites, ostéomyélites abcès à staphylocoques.

**Présentation :**

En ampoules de 10 cc.

**Mode d'emploi :**

Suivant les cas spéciaux, suivre les indications de la notice jointe aux ampoules.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

## IMMUNO-ANTIVIRUS GONOCOCCIQUE

### Indications :

Uréthrites gonococciques chez l'homme et ophtalmie blennorrhagiques. Vaginites gonococciques.

### Présentation :

Ampoules de 10 cc. (Uréthrites, ophtalmies.)

Ampoules de 25 cc. (Vaginites.)

### Mode d'emploi :

Instillations uréthrales deux ou trois fois par jour. Lavages de l'œil suivis de compresses. Tamponnements vaginaux.

### LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

---

## IMMUNO-ANTIVIRUS STAPHYLO-STREPTOCOCCIQUE

### Indications :

Impétigo — Ampoules de 10 cc.

Premier jour : cataplasmes émollients. Jours suivants : pansements à l'antivirus changés une ou deux fois par jour.

### LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**IMMUNO-VACCIN  
ANTISTAPHYLOCOCCIQUE**

**Indications :**

Furonculose, anthrax, acné suppurée, sycosis bactérien, impétigo et autres affections à staphylocoques.

Impétigo : A mélanger à du vaccin antistreptococcique.

**Présentation :**

En boîtes de 1 ampoule de 1 cc. (100 et 500 millions d'unités.)

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

---

**IMMUNO-VACCIN  
ANTISTREPTOCOCCIQUE**

**Indications :**

Erysipèle, fièvre puerpérale, lymphangites, streptococciques et autres infections à streptocoques.

Impétigo : A mélanger à du vaccin antistaphylococcique.

**Présentation :**

En boîtes de 1 ampoule de 1 cc. (10 millions d'unités.)

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

## IMMUNO-VACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

### Indications :

Septicémie colibacillaire (fièvre urinaire), abcès rénaux à colibacilles et autres infections à colibacilles.

### Présentation :

En boîtes de 1 ampoule de 1 cc. (500 millions d'unités.)  
Pour emploi, voir notice jointe aux ampoules.

### LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

---

## IMMUNO-VACCIN ANTIGRIPPAL

### Indications :

Infections grippales.

### Présentation :

En boîtes de 1 ampoule de 1 cc. (155 millions d'unités.)

### LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**IMMUNO-VACCIN  
ANTICHARBONNEUX**

**Indications :**

Pustule maligne.

**Présentation :**

En boîtes de 1 ampoule de 1 cc. (10 millions d'unités.)

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**IMMUNO-VACCIN  
ANTIGONOCOCCIQUE**

**Indications :**

Uréthrites blennorrhagiques, aiguë, chronique. Arthrite rhumatismale gonococcique. Annexites, prostatites. Epididymites et autres infections gonococciques.

**Présentation :**

En boîtes de 1 ampoule de 1 cc. (5 et 20 millions d'unités).

Pour emploi, se conformer aux indications de la notice jointe aux ampoules.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles



## IMMUNO-VACCIN ANTIRUMATISMAL

### Indications :

Rhumatisme chronique, articulaire ou musculaire. Rhumatisme articulaire aigu.

Chorée, Dyspepsie hyperacide chez les arthritiques.

### Présentation :

En boîtes séries de 5 amp. Séries I (cardiaque), II, III, IV (de 5 à 375 millions d'unités).

En boîte de 1 ampoule; dose d'entretien (50 millions d'unités).

Commencer par la série I chez les cardiaques.

Commencer par la série II chez les autres.

En ampoules buvables. Boîtes de 5 ampoules.

### LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

---

## IMMUNO-VACCIN ANTITYPHIQUE

### Préventif :

Prophylaxie de la fièvre typhoïde en cas d'épidémie.

En boîtes de 2 ampoules de 1 cc. (500 et 1000 millions d'unités).

### Curatif :

Fièvre typhoïde déclarée.

En boîtes de 1 ampoule de 1 cc. (250 millions d'unités).

Pour emploi, voir notice jointe aux ampoules.

### LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**IMMUNISINE  
ANTIPNEUMOCOCCIQUE**

**Indications :**

Pneumonie et infections à pneumocoque.

**Présentation :**

En boîtes de 1 ampoule de 2 cc.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**IMMUNO-VACCIN  
ANTIBRONCHO-PNEUMONIQUE**

**Indications :**

Pneumonies. Broncho-pneumonies.

**Présentation :**

Boîtes de 5 ampoules : 2,5, 5, 7,5, 10 et 15 millions ; pneumocoques, streptocoques, entérocoques.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> BERTRAND**

Anvers

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**IODONINE OPTIMA**

(IODE PHYSIOLOGIQUE ASSIMILABLE)

SOLUTION EN FLACON COMPTE-GOUTTES

**Composition :**

Poudre obtenue en soumettant l'iodalbumine à la digestion tryptique. L'iode s'y trouve en combinaison parfaite. L'iodonine ne produit pas de phénomènes d'iodisme, même à dose élevée.

Iode physiol. assimilable.

**Indications :**

Arthritisme, goutte, asthme, emphysème, goitre, bronchites, artériosclérose, affections glandulaires, affections microbiennes, etc.

**Doses :**

20 à 120 gouttes selon indication.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## I O D O P H A N E   B I O S

Combinaison de l'iodobenzo-hexaméthylaminophénylcinchoninique et l'acide acétylsalicylique.

### Indications :

Traitement du rhumatisme dans toutes ses formes et particulièrement dans le rhumatisme déformant et thyroïdien, névralgies, lombago sciaticques.

### Mode d'emploi :

L'iodophane est présentée en boîte de 24 capsules que l'on prescrit habituellement à la dose de 2 à 4 par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## I O D O P H A N E   I N J E C T A B L E   B I O S

### Composition :

L'iodophane injectable qui résulte de la combinaison iodobenzo-hexaméthylaminophénylcinchonine salicylique est présenté en boîtes de 10 ampoules de 5 cc. pour injections intramusculaires.

### Mode d'emploi :

Pour le rhumatisme aigu, une ampoule par jour puis espacer au fur et à mesure de l'amélioration.

Rhumatisme chronique, deux à trois ampoules par jour (voir aussi vaccin antirhumatismal).

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## I O D O T R O P I N E   B I O S

### Composition :

L'iodotropine est une combinaison stable résultant de l'association de l'iode à l'hexaméthylène tétramine en milieu benzoilé et renfermant 40 % d'iode métallique et 50 % d'hexaméthylène tétramine.

### Indications :

Traitement des infections générales, rhumatismes dans toutes ses formes, y compris le pseudorhumatisme infectieux, les affections des reins et de la vessie, l'asthme dans toutes ses variétés, l'artériosclérose, la goutte, le goitre et dans certains cas de maladies de Basedow, la syphilis, le scrofule, l'obésité, l'encéphalite léthargique où il est recommandé de l'employer à doses massives, différentes formes de tuberculose.

### Mode d'emploi :

L'iodotropine est présentée en boîtes de 10 ampoules de 5 cc. renfermant chacune 50 cgr. d'iodotropine que l'on emploie à la dose de 2 à 6 par semaine; dans les infections graves ces doses peuvent être doublées, injections intraveineuses.

En flacons de 50 comprimés dosés à 0,50 cgr. que l'on prend habituellement de 2 à 4 par jour. Afin de permettre aux médecins de prescrire ce médicament en prescription magistrale, l'iodotropine est également délivrée en vrac en flacon de 25, 50 et 125 grammes.

### Prescription magistrale :

Iodotropine 10 - S. d'Ecorces OR. Am. 100 - Eau dist. Q. S.  
310 cc. Deux à quatre cuillerées à soupe par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**IODO-THEINE HENRY**

Flacon de 150 cc.)

Prix : 16 fr. 50.

**Composition :**

Solution renfermant par cuill. à café du pépionon (quantité répondant à 0,075 gr. d'iode). Caféine 0,12 dissoute par le benzoate de soude).

**Indications :**

Par son action sclérorisante et tonocardiaque, trouve son emploi dans les crises d'asthme et d'emphysème en désasphyxiant le malade.

Abaisse la tension artérielle, augmente la fréquence des battements du cœur, fluidifie les sécrétions bronchiques, d'où expectoration plus aisée, dissipe les stases, favorise la circulation pulmonaire.

**Doses :**

2 à 3 cuill. à café par jour dans l'eau.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**IODYNE D' BROWN****Formule :**

Iode 1 cgr. par c. à soupe. Iodure de potasse. Teinture de Benjoin. Teinture de Tolu. Extrait fluide de pavot rouge. Sirop de Candi.

**Indications :**

Rhumes négligés. Bronchite. Asthme. Toux opiniâtre.

**Posologie :**

Adultes : 5 cuillerées à dessert par jour une demi-heure avant le repas.

Adolescents de 10 à 15 ans : 5 cuillerées à café par jour.

Enfants de 5 à 10 ans : 4 petites cuillerées à café par jour.

**Prix :**

Prix : 20 francs le flacon.

**LABORATOIRES GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

**I O P H E N A L****Composition :**

Solution huileuse d'iode et d'éther phénylsalicylique en ampoules stérilisées pour injections intramusculaires.

Agit comme sédatif de la douleur rhumatismale et modificateur de la diathèse arthritique. Par sa résorption lente agit d'une manière continue et prolongée.

**Indications :**

Myosite, fibrosite, arthrite aiguë ou chronique, névrites, névralgies, rhumatisme articulaire chronique de la ménopause, du myxœdème, ostéoarthrite, diathèse arthritique, artériosclérose.

**Doses :**

Débuter par l'injection à deux jours d'intervalle d'une ampoule de 2 cc. Continuer par l'injection tous les deux jours d'une ampoule de 5 cc. Dans certains cas rebelles, il est indispensable de prolonger le traitement par l'injection de plusieurs séries d'ampoules d'Iophénal. Dans ce cas, il y a lieu de séparer chaque série de 10 ampoules par un intervalle de quinze jours.

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**JECORINE OPTIMA (Emulsion)****Composition :**

Emulsion d'huile de foie de morue absolument pure, riche en vitamines A et glycer. de chaux.

**Indications :**

Rachitisme, scrofule, anémie, goutte, rhumatisme, certaines affections chroniques de la peau (lupus, ichtyose).

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

---

**Toutes les reliures aux**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**



**KINO-PANCREATINE HENRY**

(Flacon de 50 pilules)

Prix : 18 francs.

**Composition :**

Pancréatine active 0,15 gr. + entérokinase 0,05 gr. + carbonate de calcium 0,05 gr. pour une pilule enrobée au gluten.

La Kino-Pancréatine Henry est préparée suivant les travaux de A. Renaud qui a prouvé qu'au triple point de vue amylique, protéolytique et lypolytique, la pancréatine administrée sous forme de poudre ou sous forme liquide, ne peut agir, l'acidité stomacale et la présence de pepsine étant néfastes aux trois ferments contenus dans la pancréatine.

Pour agir, la pancréatine doit être libérée dans l'intestin et pour ce, être absorbée sous forme de pilules enrobées au gluten.

L'entérokinase et le carbonate de calcium interviennent dans l'activation de la pancréatine.

**Indications :**

Dyspepsie, entérite, insuffisance digestive, diabète (cure d'entretien).

**Mode d'emploi :**

1 à 3 pilules à chaque repas.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**L A C R E N I L E****Composition :**

Sérum de lait urénilé.

Protéinothérapie (choc) et chimiothérapie associées.

**Indications :**

Tous processus infectieux. Dermatoses du groupe de l'eczéma.  
Urticaires rebelles. Psoriasis.

**Posologie :**

Injections intramusculaires successives de 5 cc., 6 cc., 7,5 cc.,  
8 cc., 9 cc. et 10 cc. (Voir notice spéciale.)

**Présentation :**

Boîtes de 10 ampoules de 5 cc.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**LACTOCASEOL BIOS****PROTEINOTHERAPIE****Composition :**

Solution stérile des protéines du lait exempte de toxines dosées à 5 %.

**Indications :**

Grippe infectieuse, pneumonie, ulcère de l'estomac, sciatique, rhumatisme, névralgie, paralysie générale, infections oculaires.

Dans ces affections, on emploie de préférence les ampoules de 5 cc. à la dose de 1 à 2 par semaine pour les espacer ensuite au fur et à mesure de l'amélioration.

*Affections cutanées et vénériennes :* Eczéma, urticaire, épithéliome, polyarthrite rhumatismale, psoriasis, ampoules de 2 cc. Deux injections par semaine.

*Maladies des yeux :* Infections oculaires, kératite, iritis, etc.; injection d'une ampoule de 2 cc. Une à deux par semaine et plus, selon l'amélioration.

En boîte de 6 ampoules 2 cc. et de 5 ampoules 5 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES****Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**LACTO FERMENT OPTIMA**

(COMPRIMES)

**Composition :**

Cult. bacil. ac. lact. à 37°.

**Indications :**

Troubles intestinaux, entérites, dermatoses, etc.

**Doses :**

3 à 10 comprimés par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**La reliure et la brochure d'art**

doivent être confiées aux

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

**LACTYL****Composition :**

Ferments lactiques à l'état de vie latente.

**Indications :**

*Affections gastro-intestinales aiguës et chroniques :* (troubles digestifs des nourrissons; diarrhée; entérites; etc.)

*Auto-intoxications d'origine digestive :* (furunculose; acné; eczéma, urticaire, etc.).

*Affections des glandes annexes de l'intestin :* (diabète; lithiase hépatique; cirrhoses du foie, pancréatites infectieuses, etc.)

**Posologie :**

3 à 6 comprimés par jour chez les enfants.

6 à 12 comprimés par jour chez les adultes; en trois fois, aux trois repas, dans un peu de lait sucré.

**Présentation :**

Flacons de 50 comprimés à 0,30 gr.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division, Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires: 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique: 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif:

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôt de province

**LACTYL GRANULE CHOCOLATE****Composition :**

Ferments lactiques purs à l'état de vie latente.

**Indications :**

Entérite. Entéro-colite. Dysenterie. Furonculose. Eczéma.

**Posologie :**

Dissoudre une cuillerée à café de granulés dans une tasse de lait tiède sucré, trois à quatre fois par jour.

**Présentation :**

Flacons d'origine de 250 grammes environ.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

**LAXATINE MORY (Dragées)****Composition :**

Extrait de cascara sagrada ; 15 cgr. par dragée.

**Indications :**

Spécifique de la constipation chronique.

**Doses :**

Une dragée le matin et une le soir.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**  
78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**LAXOLIP HENRY**

149

Flacon de 40 pilules)

Prix : 16 francs.

**Composition :**

Chaque pilule enrobée au gluten contient :

- 1° Ferment lactique sélectionné sur lactose 0,05 gr. ; amidon 0,05 gr. (association donnant les meilleures conditions de prolifération du ferment lactique).
- 2° Extrait biliaire 0,10 gr. (action sur l'excitomotricité de la fibre lisse intestinale).
- 3° Extrait total de l'intestin 0,05 gr. (influence excitante sur les cellules intestinales et rôle antitoxique).
- 4° Lipoïdes (cholestérine et lécithine 0,007 gr., lécithine suractivant processus de défense, cholestérine antitoxique).

**Doses :**

Deux pillules à chaque repas, augmenter ou diminuer suivant effet.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

## L E B E N O L

### Composition :

Culture symbiotique de *Streptobacillus Lebenis* et de *Diplococcus (streptococcus)*. *Lebenis* recueillie en surface de milieu solide et desséchée.

### Indications :

Plaies infectées diverses (accidentelles, opératoires, variqueuses, de décubitus, etc.), brûlures, fistules, phlegmons, abcès, otites suppurées, cystites, métrites, entéro-colites de tous âges.

### Posologie :

Laver soigneusement la région d'application à l'eau bouillie, sans addition d'aucun antiseptique.

Préparer une solution à 1 % de *Lébénol* dans l'eau ou le sérum physiologique stériles et refroidis, et l'utiliser sous forme de pansement, d'injections ou de lavages. Renouveler l'opération, une ou deux fois par jour.

Dans les entéro-colites, après lavement évacuant, appliquer à la sonde molle un lavement au *Lébénol* (0,1 %).

### Présentation :

Tubes de 20 comprimés à 0,50 gr. (additionnés de chlorure de sodium).

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province



## LIPO CEREBRAL BIOS

### Composition :

Extrait huileux contenant les lipoïdes spécifiques phosphorés du cerveau.

Boîte de 10 ampoules de 2 cc.

### Indications :

Maladie du système nerveux central, débilité, psychonévroses, paralysie générale, neurasthénie, surmenage intellectuel.

### Mode d'emploi :

Une injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours et espacer dès amélioration.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

## LIPO HYPOPHYSE BIOS

### Composition :

Solution huileuse contenant les lipoïdes spécifiques de 1 gramme d'hypophyse totale par cc.

### Indications :

Asthénie, diabète, insipide, relèvement de la pression artérielle, retard de la croissance, infantilisme.

### Mode d'emploi :

2 à 3 injections par semaine.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

## LIPO LUTEINE BIOS

### Composition :

Ampoules d'extrait huileux contenant les lipoïdes spécifiques de 50 mgr. de corps jaune.

### Indications :

Dysménorrhée continue, menstruation profuse, hémorragie de la puberté et de la ménopause.

### Mode d'emploi :

1 à 3 injections sous-cutanées ou intramusculaires par semaine.  
Boîte de 10 ampoules de 2 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## LIPO ORCHITIQUE BIOS

154

### Composition :

Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. contenant les lipoïdes de 1/2 glande testiculaire.

### Indications :

Dépression par suite de surmenage physique ou intellectuel, infantilisme masculin, impuissance, sénilité précoce, hypertension, arriération chez les adolescents, troubles hypo-ovariques ayant résistés à la médication ovarienne.

### Mode d'emploi :

2 à 6 injections par semaine, voie intramusculaire.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## LIPO SURRENAL BIOS

### Composition :

Ampoules de solution huileuse contenant les lipoides spécifiques de la glande totale.

### Indications :

Complications malignes de la scarlatine, grippe, typhus, rougeole, oreillons, maladie d'addison, hyposthénie, hypotension vasculaire (tuberculeux), asthme, intoxication.

### Mode d'emploi :

Une ou deux ampoules par jour en injections sous-cutanées ou intramusculaires.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles. (Téléph. : 15.49.30)

---

## LITHAGOGUE SIX

Association médicamenteuse liquide d'une grande puissance cholagogue.

### Indications :

Etats congestifs du foie, ictères, coliques hépatiques ; permet d'éviter l'intervention chirurgicale dans la plupart des cas de lithiase.

### Doses :

Cinq cuillerées à café par jour.

**PHARMACIE « SIX »**

Canal de l'Ancre, 24, Anvers

**LYSOMOL**

## Antiseptique et désinfectant

Liquide à base de formaldéhyde et de savon.

La puissance antiseptique et bactéricide a été établie par le docteur Léon Bertrand, d'Anvers, et par le docteur Bessemans, professeur d'hygiène à l'Université de Gand.

1° Une solution de Lysomol à 2 %, empêche la croissance de tous les germes pathogènes, même des bacilles à spores.

2° Les bacilles du typhus et de la diphtérie et le staphylocoque doré sont tués après une heure de contact avec une solution à 2,5 % à la température ordinaire; après une demi heure à température ordinaire, avec une solution à 5 %.

Constance d'activité garantie; contrôle du Laboratoire d'Hygiène de l'État.

**Indications :**

Chirurgie, gynécologie, obstétrique, maladies contagieuses.

*Antiseptique idéal pour les accouchements.*

Le Lysomol a une odeur agréable, il n'attaque pas la peau, il ne tache ni le linge ni les instruments.

Prix : le flacon, 12 fr. ; le demi-flacon, 6 fr.

**LABORATOIRE A. J. HENDRIX**

Rue van Beers, 4, Anvers

(Boîte de 160 gr.)

Prix : 7 fr. 25.

**Composition :**

Bicarbonate de soude chimiquement pur, acide tartrique, carbonate de lithine 1 p. c.

**Propriété :**

Donne une eau gazeuse agréable de composition constante et d'une activité thérapeutique incontestable. En cas d'épidémie, bonifie l'eau cuite en lui donnant un léger goût acidulé produisant une sensation de fraîcheur.

**Indications :**

Antigoutteux. A une puissance de dissolution de l'acide urique des plus considérables.

**Technique d'emploi :**

Une mesurette par verre ou cinq mesurettes par litre d'eau.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Selessin, 39, Liège

---

**Par contrat avec la Maison des Médecins, les**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

accordent 15 % de ristourne sur leurs prix courants

## MAMELLINE MEURICE

### Composition :

Extrait total endocrinien de glande mammaire fraîche.

### Indications :

Sécrétion lactée insuffisante. Régularisation et modération de la menstruation. Métrorragies.

### Posologie :

Un comprimé à 0,30 gr. correspond à 2,40 gr. de tissus frais de glande mammaire de vache.

Dose quotidienne moyenne : 2 à 4 comprimés à prendre de préférence une demi-heure avant les repas.

### Présentation :

Flacons de 50 comprimés à 0,30 gr.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

**MANGANO-FER HENRY**

(Flacon de 250 cc.)

Prix : 16 fr. 50.

**Composition :**

Elixir très agréable renfermant, par cuillère à soupe :

1° Peptonate de fer répondant à 0,01 gr. de fer métal :

2° Peptonate de manganèse répondant à 0,005 gr. manganèse métal ;

3° Méthylarsinate de soude 0,02 gr.

Ces sels organiques sont dissous dans du plasma musculaire de bœuf.

**Indications :**

Le fer, le manganèse (agissant comme catalyseur) et l'arsenic unis à cette opothérapie musculaire, produit en très peu de temps les effets suivants :

1° Augmentation du nombre de globules rouges et de leur teneur en hémoglobine ;

2° Disparition des souffes vasculaires de la chlorose et de l'anémie ;

3° Augmentation du poids du corps ;

4° Réveil de l'appétit défailant.

**Doses :**

Adultes : 3 cuillerées à soupes par jour aux repas.

Enfants de 10 à 16 ans : 3 cuillerées à dessert.

Enfants de 5 à 10 ans : 3 cuillerées à café.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**M E R A L**

(POUDRE STOMACHIQUE)

**Composition :**

Natr. bic. ; natr. chlor. ; calc. carb. ; magn. oxyd. ; calc. phosph. ;  
acid. tartaric.

**Indications :**

Gastralgie, fermentations anormales, hyperacidité, dilatation de  
l'estomac, nausées, vomissements, mauvaise digestion, troubles gas-  
triques de la grossesse.

**Posologie :**

Une forte cuillerée à café (10 gr. environ) dix minutes après  
les repas, dans un verre d'eau fraîche ou chaude.

**Présentation :**

Boîtes entières.  
Demi-boîtes.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles  
Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province



## MOELLE OSSEUSE BIOS

### Composition :

Cachets dosés à 0,20 cgr., soit 1 gramme d'organe frais.

### Indications :

Anémie, leucémie, rachitisme, cachexie.

### Mode d'emploi :

3 à 4 par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## NEO-PITUITAIRE

(AMPOULES) BOITES DE 3, 6, 100 AMPOULES

### Composition :

Principe actif du lobe post. de la glande pituit. dosé biologiquement.

### Indications :

Atonie de l'utérus, atonie gastrique, intestinale et vésicale, incontinence urinaire chez l'enfant, hémoptysie.

### Doses :

Ampoules de 5 à 10 u. Voegtlin.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**NEOTYROL (Comprimés ou Extrait fluide)****Composition :**

Extrait de glandes thyroïdes de moutons.

Chaque comprimé correspond à 0,30 gr. de corps thyroïde frais.

Trente gouttes d'Extrait fluide correspondent à 0,30 gr. de corps thyroïde frais.

**Indications :**

Myxœdème, Obésité, Infantilisme, Troubles menstruels, Syndrome d'Herthoge, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose.

**Doses :**

1 à 4 comprimés par jour après les repas.

Extrait : 15 à 30 gouttes deux fois par jour, après les repas.

L'étui de 60 comprimés : 14 fr.

Le flacon d'extrait fluide : 12 fr.

Laboratoire d'Opothérapie U. T. A.

**ETABLISSEMENTS PAUL THIWISSEN**

13, rue Sainte-Véronique, Liège

*Echantillons gratuits sur demande.*

**NEOVARINE (Comprimés)****Composition :**

Extraits d'ovaires d'animaux jeunes.

Chaque comprimé correspond à 0,30 gr. de glande fraîche.

**Indications :**

Castration, Insuffisance ovarienne, Ménopause, Obésité féminine, Troubles de la puberté, Chlorose.

**Doses :**

4 à 6 comprimés par jour après les repas.

L'étui de 60 comprimés : 14 fr.

Laboratoire d'Opothérapie U. T. A.

**ETABLISSEMENTS PAUL THIWISSEN**

13, rue Sainte-Véronique, Liège

*Echantillons gratuits sur demande.*

**NEUROTONINE OPTIMA**

(Flacon granulé)

**Composition :**

Une cuillerée à café contient :

25 mgr. extrait de coca ;

50 mgr. extrait de quinquina ;

25 mgr. glycérophosphate de chaux.

**Indications :**

Reconstituant et tonique du système nerveux.

Débilité générale, neurasthénie.

**Doses :**

Deux à 4 cuillerées à café par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**Une reliure « R. I. P. R. A. »****éternellement vivra****ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

## NEVROSAN

### Composition :

Teinture de cratœgus, teinture de passiflore et alcoolature de Ballote.

### Indications :

*Gynécologie* : Troubles hystéro-nerveux de la puberté, grossesse, ménopause, dysménorrhée, aménorrhée.

*Voies digestives* : Eréthisme gastrique; dyspepsies nerveuses, spasmes du duodénum, spasmes œsophagiens.

*Cœur* : Eréthisme cardio-vasculaire, palpitations angiospasmé.

*Psychiatrie* : Psychoses fonctionnelles.

*Médecine infantile* : Coqueluche.

### Doses :

Action sédative, 60 gouttes le soir au coucher.

Action antispasmodique, 30 gouttes trois fois par jour avant les repas.

A prendre dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

**NUCLEARHOL GABRIEL**

(Flacon de 250 cc.)

Prix : 17 francs.

Elixir très agréable renfermant par cuillère à soupe : 0,268 gr. de nucléophosphate de soude méthylarsiné (0,021 gr. de méthylarsinate de Na).

**Indications :**

Puissant reconstituant, convalescence, maladies du système nerveux, affections dérivant de la pauvreté du sang, troubles de la nutrition, affections osseuses, tuberculose.

**Propriétés thérapeutiques :**

Excite l'appétit, fait augmenter le poids, rend la toux moins quinteuse et plus facile, reminéralise.

**Doses :**

Adultes : 3 cuillères à soupe par jour.

Enfants de 10 à 16 ans : 3 cuillères à dessert.

Enfants de 5 à 10 ans : 3 cuillères à café.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39. Liège

**NUXYL (Sirop)****Reconstituant complet**

Combinaison stable d'hémoglobine, d'iode, de tannin, de sels phosphatés calciques solubles en présence d'amers et de toniques.

**ASSIMILATION PARFAITE****Indications :**

Anémie. Neurasthénie. Dépressions morale et physique. Surmenage. Reminéralisateur. Combat la dénutrition, répare la déperdition nerveuse, fortifie le sang.

**Doses :**

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert ou à café par jour.

Prix : 16 francs.

Concessionnaire pour la Belgique et la Colonie :

**G. VAN HASSELT**

155, avenue Orban Van Volxem, Stockel-Bruxelles

## O I O T H Y R O I D I N E O P T I M A

(Flacons de 50 comprimés à 2, 5, 10 et 30 cgr.)

### Composition :

Extrait de glandes thyroïdes corresp. à 2, 5, 10 et 30 cgr. de glandes fraîches.

### Indications :

Maladies corps thyroïde (myxoédèmes, goitres), obésité, nanisme, infantilisme, rachitisme, certaines dermatoses, etc.

### Doses :

3 à 6 comprimés par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

---

## O N G U E N T A N A T O X I N E D I P H T E R I Q U E « B I O S »

171

### Composition :

Onguent contenant 50 % d'anatoxine.

### Indications :

Vaccination locale, porteurs de germes.

### Mode d'emploi :

Afin de permettre à l'onguent de fondre doucement tout en tapissant les muqueuses du nez et du pharynx, introduire pendant quinze jours, le soir avant le coucher, gros comme un petit pois d'onguent dans chaque narine.

*Méthode Lœwenstein* : tous les huit jours friction de la peau avec environ 1 gramme de pommade jusqu'à absorption.

**M. et H. COUDELIER FRÈRES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

## ONGUENT IMMUNISANT BIOS

### Composition :

Lanoline pure saturée de Lysas polymicrobiens Bios, mais où le staphylocoque blanc et doré entre comme principal agent.

### Indications :

Furoncles, anthrax, fistules, ulcères variqueux, acné, folliculite, sycosis, etc.

### Mode d'emploi :

Etendre au niveau de l'endroit enflammé, la plaie, le furoncle, la fistule, etc., une quantité d'onguent suffisante pour l'imprégner complètement. La composition spéciale de cet onguent permet, en effet, l'absorption complète de ces ingrédients par la peau et constitue une vaccination locale. Faire trois ou quatre applications identiques par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**  
Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

## OVULES IMMUNISANTS BIOS

(Boîte de 6 ovules gélatineux.)

## PANSEMENT GYNECOLOGIQUE IMMUNISANT

Saturé de filtrat à base de gono, staphylo, diplocoques, coli, strepto, pyocyaniques pour applications locales.

En pansement immunisant dans le traitement des infections gynécologiques ou puerpérales, métrite, métrite salpyngite, paramétrite, vaginite, abcès du Douglas. Application le soir après une injection aseptique.

(Application le soir après une injection aseptique.)

**M. et H. COUTELIER FRERES**

Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**ANTIVIRUSOTHERAPIE DES SUPPURATIONS****PAR LES****PANSEMENTS IMMUNISANTS****« BIOS »****Composition :**

Filtrat de Lysas polymicrobiens.

Boîtes de 2 ampoules de 10 cc. pour applications locales.

**Indications :**

Toutes les suppurations, abcès, furoncles, immunisation du champ opératoire.

**Mode d'emploi :**

On verse le tiers, le quart ou la moitié du contenu d'une ampoule sur un morceau de gaze ou d'ouate hydrophile stérile qu'on applique ensuite sur la plaie, le furoncle, l'anthrax, la fistule. On recouvre le tout d'un morceau de toile de Billroth et l'on fixe à l'aide de quelques bandelettes de sparadra ou à l'aide d'une bande de gaze. Durée d'application : 6 à 12 heures.

Dans les cas aigus, faire deux applications journalières identiques et renouveler ce traitement tous les jours jusqu'à sédation complète des symptômes inflammatoires.

**M. et H. COUTELIER FRERES****Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)



## PANSEMENT IMMUNISANT OPHTHALMOLOGIQUE BIOS

Présenté en ampoules collyre et onguent ophtalmologique.

### Composition :

Préparé à l'aide de nombreuses souches isolées dans de multiples cas d'infection oculaire, notamment le staphylocoque, le streptocoque, le pneumocoque, etc., présenté sous deux formes distinctes.

### Mode d'emploi :

Instillation à l'aide de l'ampoule collyre de 3 à 4 gouttes de bouillon « loco dolenti » à raison de quatre ou cinq instillations journalières.

*Onguent* : applications locales, deux à trois fois par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

**Demandez le tarif des prix  
courants de reliure aux**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

**ONGUENT SURRENAL****Composition :**

Extrait surrénal naturel (chlorhydrate de méthylaminoéthanol pyrocatéchine lévogyre), lanoline, vaseline blanche, stovaïne, essence de géranium, extrait mou de ratanhia.

**Indications :**

Rhume des foins, coryza aigu, asthme d'origine nasale, conjonctivite, blépharite, fissures ou prurit de l'anus, hémorroïdes, petits angiomes.

**Posologie :**

En applications directes quatre ou cinq fois par jour.

**Présentation :**

Tubes à canule.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**OOPHORINE (Vin)****Composition :**

A base d'extrait ovarique.

**Doses :**

1 à 2 verres à liqueur par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**ORCHIDINE OPTIMA**

(Flacons de 50 comprimés)

**Composition :**

Flacons de 50 comprimés correspondant chacun à 0,60 de testicules frais de bélier.

**Indications :**

Puberté insuffisante, débilité en général, insuffisance testiculaire endocrinienne, affections nerveuses, sénilité précoce.

**Doses :**

4 à 6 comprimés par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**ORCHITINE BIOS****Composition :**

Comprimés dosés à 0,20 cgr. d'extrait orchitique, soit 1 gramme de la glande fraîche.

Boîte de 10 ampoules de 2 cc.

Extrait orchitique en solution physiologique

**Indications :**

Tous les états de dépression dus au surmenage physique et intellectuel (voir Hormogland. M), infantilisme, frigidité et impuissance, sénilité précoce, troubles de la vieillesse, troubles hypo-ovariques ayant résistés à l'opothérapie ovarienne. Affections néoplasiques.

**Mode d'emploi :**

1. 2 à 4 comprimés par jour.

2. Une injection par jour puis espacer.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. 15.49.30)

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

**Ses reliures de bibli-**  
**thèque et de fantaisie**

**Organisation et remise à neuf de bibliothèques**

## ORCHITINE MEURICE

### Composition :

Extrait total endocrinien de glande testiculaire fraîche.

### Indications :

Insuffisances testiculaires endocriniennes (cryptorchidie, atrophie postinfectieuse, sclérose), sénilité précoce, syndrome adiposogénital, puberté insuffisante.

### Posologie :

Un comprimé de 0,50 gr. correspond à 4 grammes de tissus frais de testicule de bélier.

Dose quotidienne moyenne : 2 à 4 comprimés, de préférence une demi-heure avant les repas.

### Présentation :

Flacons de 50 comprimés à 0,50 gr.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**O V A R I D I N E****Composition :**

Association pluri-glandulaire (ovaro-thyroïdine).

**Indications :**

Insuffisances endocrines, aménorrhées de ménopause ou de puberté, sclérodermie, rhumatismes chroniques, troubles circulatoires relevant de la ménopause.

**Posologie :**

Doses croissantes de 2 à 4 ou 6 comprimés par jour, par période de dix à quinze jours, mensuellement.

**Présentation :**

Flacons de 50 comprimés à 0,30 gr.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## OVARINE BIOS

### Composition :

Extrait total de l'ovaire desséché dans le vide à basse température et contenant la totalité des principes actifs (folliculine et lipoïdes).

### Indications :

Dans les traitements de l'aménorrhée, dysménorrhée, hypoplasie utérine, troubles de la ménopause et en général hypo-fonctionnement ovarien. Dermatoses. Eczémas d'origine endocriniennes.

### Mode d'emploi :

2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

En comprimés dosés à 20 cgr. d'extrait représentant 1 gramme de la glande fraîche.

En cachets à différents dosages selon prescription.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

## OVARINE INJECTABLE BIOS 183

(EXTRAIT FOLLICULAIRE)

### Composition :

Solution physiologique titrée de Folliculine hydrosoluble = environ 1 gramme d'ovaire par cc.

### Indications :

Traitement de l'aménorrhée, dysménorrhée, hypoplasie utérine, troubles de la ménopause et en général hypo-fonctionnement ovarien

### Mode d'emploi :

1 à 3 injections par huit jours.

Boîte de 10 ampoules de 2 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

## OVARINE MEURICE

### Composition :

Extrait ovarien total.

### Indications :

Puberté (menstruations pénibles, rares ou trop peu abondantes).  
Troubles de la ménopause (bouffées congestives, palpitations, hypertension vasculaire, troubles neuro-psychiques, obésité).

Son emploi est indispensable chez les ovariectomisées.

### Posologie :

Un comprimé à 0,50 gr. correspond à 1 gr. d'organe frais.

Généralement 3 à 6 comprimés par jour.

### Présentation :

Flacons de 50 comprimés à 0,50 gr.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province



**OVARINE-OPTIMA**

Flacon de 50 comprimés correspondant chacun à 50 cgr. d'ovaire frais.

**Indications :**

Insuffisance ovarienne, troubles de la ménopause naturels ou postopératoires.

**Posologie :**

4 à 6 comprimés par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

---

**OVARO-THYROIDINE OPTIMA**

Flacon de 50 comprimés pluriglandulaires dosés à raison de 20 cgr. glande ovarienne fraîche et 10 cgr. glande thyroïde fraîche par comprimé.

**Indications :**

Insuffisances endocrines, troubles de la ménopause naturels ou postopératoires, obésité, rhumatisme chronique et déformant, troubles circulatoires relevant de la ménopause.

**Doses :**

3 à 6 comprimés par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## OVULES « GYNOL » SIMPLES

*Prix*

Ovules « Gynol » à la glycérine 31°-16 gr. ... .. 20,—

### Indications :

Congestion de l'utérus et de ses annexes.

---

188

## OVULES « GYNOL » ANTISEPTIQUES

Ovules « Gynol » Argent colloïdal 0,10 ... ..	30,—
Ovules « Gynol » Argyrol « Barnès » 0,10 ... ..	30,—
Ovules « Gynol » Collargol « Van Heyde » 0,10 ... ..	30,—
Ovules « Gynol » Cupro-Picro-Zinciques ... ..	24,—
Sulfate de cuivre ... .. 15 cgr. }	} associés
Sulfate de zinc .. ... 10 cgr. }	
Acide picrique... .. 5 cgr. }	
Ovules « Gynol » au Dermato 1« Hoechst » 50 cgr. ...	24,—
Ovules « Gynol » à l'Ichthyol « Cordès » 50 cgr....	24,—
Ovules « Gynol » à l'Ichthyol-Belladone... ..	20,—
Ichthyol « Cordès » ... .. 50 cgr. }	} associés
Extrait de Belladone ... .. 5 cgr. }	
Ovules « Gynol » Ichthyol-Cocaïne .. ...	24,—
Ichthyol « Cordès » ... .. 50 cgr. }	} associés
Chlorhyd. de cocaïne ... .. 5 cgr. }	
Ovules « Gynol » au Protargol « Bayer » 25 cgr. ...	24,—
Ovules « Gynol » au Protargol « Bayer » 50 cgr. ...	30,—
Ovules « Gynol » au Protargol « Bayer » 1 gr. ... ..	36,—
Ovules « Gynol » au Sulfate de cuivre 25 cgr. ... ..	20,—

Ovules « Gynol » au Thigénol « Roche »	50 cgr.	...	20,—
Ovules « Gynol » au Thigénol-Belladone		...	20,—
Thigénol « Roche »	50 cgr.	} associés	
Extrait de Belladone	5 cgr.		
Ovules « Gynol » au Thymol-Belladone		...	30,—
Thymol	10 cgr.	} associés	
Extrait de Belladone	5 cgr.		

189

### OVULES « GYNOL » ASTRINGENTS

Ovules « Gynol » au Dermatol « Hoechts »	50 cgr.	...	24,—
Ovules « Gynol » Sulfate de zinc	10 cgr.	...	20,—
Ovules « Gynol » Tannin A	25 cgr.	...	24,—
Ovules « Gynol » Tannin B	50 cgr.	...	24,—
Ovules « Gynol » Tannin C	1 gr.	...	30,—

190

### OVULES « GYNOL » EMMENAGOGUES

Ovules « Gynol » à l'Apiol		...	30,—
Apiol jaune	50 cgr.	} associés	
Essence de cannelle	5 cgr.		
Ovules « Gynol » Sulfate de quinine	30 cgr.	...	24,—

191

### OVULES « GYNOL » RESOLUTIFS

Ovules « Gynol » Iodure de potasse	20 cgr.	...	20,—
Ovules « Gynol » Iodure de potasse-Belladone		...	20,—

Iodure de potasse..	...	...	20 cgr.	} associés
Extrait de Belladone	...	...	5 cgr.	

Ovules « Gynol » au Thigénol-Mentholé . . . . . 24.—

Thigénol « Roche »	...	...	50 cgr.	} associés
Iodure de potasse ..	...	...	5 cgr.	
Extrait de Belladone	...	...	3 cgr.	
Menthol ..	...	...	1 cgr.	

192

### OVULES « GYNOL » SEDATIFS

Ovules « Gynol » Belladone A 5 cgr. ... .. 20.—

Ovules « Gynol » Belladone B 10 cgr. ... .. 20.—

Ovules « Gynol » Belladone et cocaïne ... .. 24.—

Extrait de Belladone	...	...	5 cgr.	} associés
Chlorhydrate de cocaïne	...	...	5 cgr.	

Ovules « Gynol » Camphre-Belladone ... .. 30.—

Champre de Bornéo	...	...	1 gr.	} associés
Extrait de Belladone	...	...	5 cgr.	

Ovules « Gynol » cocaïne ... .. 24.—

Chlorhydrate de cocaïne	...	...	5 cgr.	} associés
Extrait de Belladone	...	...	5 cgr.	
Ichthyol « Cordès »	...	...	50 cgr.	

Ovules « Gynol » Opio-Ichthyolés ... .. 20.—

Extrait d'opium	...	...	5 cgr.	} associés
Ichthyol « Cordès »	...	...	50 cgr.	

Ovules « Gynol » Opio-Ichthyol-Belladone ... .. 20.—

Extrait d'opium	...	...	5 cgr.	} associés
Ichthyol « Cordès »	...	...	50 cgr.	
Extrait de Belladone	...	...	5 cgr.	

Ovules « Gynol » Opio-Ichthyol-Mentholés ... .. 24.—

Extrait d'opium ... ..	5 cgr.	} associés
Ichthyol « Cordès »... ..	50 cgr.	
Extrait de Belladone ... ..	5 cgr.	
Menthol .. .. .	3 cgr.	

Ovules « Gynol » à la percaïne « Ciba », 5 cgr. ... ..	24,—
Ovules « Gynol », sulfate de quinine, 30 cgr.... ..	24,—

**OVULES « GYNOL »**  
à toute formule spéciale

à la demande de MM. les médecins.

**LABORATOIRES GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

193

**PANCREINE BIOS**

**Composition :**

Comprimés dosés à 0,50 cgr. de pancréas total.

**Indications :**

Pancréatite chronique, lithiase biliaire avec altération du pancréas, gastro-entérite des nourrissons, dyspepsie, aide à la suralimentation des tuberculeux, diabète, cancer.

**Mode d'emploi :**

2 à 4 comprimés par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## PANDIGITALE OPTIMA

(Teinture forte)

### Composition :

Teinture forte, alcoolique, de feuilles de digitale débarrassées des matières grasses reconnues inutiles. Elle contient inaltérée la totalité des principes actifs de la plante. La pandigitale est titrée biologiquement par la méthode de Hatcher-Magnus sur le chat.

### Indications :

Toutes les indications de la digitale : hyposystolies, asystolies, insuffisances mitrales, fibrillation auriculaire, myocardites, angine de poitrine, asthénie cardiaque dans les maladies infectieuses, asthénie et dilatation cardiaque dans les affections pulmonaires, emphyseme, bronchite, pneumonie.

### Doses :

Un gramme de Pandigitale correspond à 15 cgr. de feuilles de digitale stand., soit 1,5 u. cardiotonique internationale. Trente-cinq gouttes de Pandigitale correspondent à 10 cgr. de feuilles de digitale stand., soit un quart de mlgr. de digit. crist. soit 1 un. cardiot. intern.

*Dose massive* : antiasystolique, diurétique : 125 gouttes ou 2,5 gr. de pandig. en un jour ou répartie en deux ou trois jours.

Une fois par quinzaine, *dose moyenne tonique et sédative cardiaque* : 15 gouttes de Pandigitale 1 à 3 fois et plus, si besoin, par jour pendant deux ou trois jours. Repos consécutif de quinze jours.

*Dose d'entretien* : 5 à 10 gouttes de Pandigitale par jour pendant dix jours ou plus suivant la dose et les résultats obtenus avec repos consécutif variable.

*Dose maxima* : 70 gouttes en une fois; 140 gouttes en vingt-quatre heures, une fois par quinze jours.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## PAPAINÉ HENRY

(Flacon de 250 cc.)

Prix : 17 francs.

Siróp d'un goût délicieux, renfermant 0,45 gr. de papaine par cuill. à soupe.

### Propriétés :

- 1° La digestion s'opère normalement ; la peptone en résultant est rapidement dialysée.
- 2° Réveil de l'appétit défaillant avec suppression de la répulsion pour les aliments.
- 3° Cessation des vomissements et vertiges gastriques.
- 4° Disparition des douleurs gastralgiques dans l'ulcère rond.

### Doses :

1 verre à liqueur après chaque repas.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

---

Toutes les reliures aux

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

## PAPAVÉRINE MEURICE

### Composition :

Chlorhydrate de papavérine.

### Indications :

Douleurs de l'ulcère gastrique, sténoses spasmodiques du pylore, vomissements réflexes (compressions cérébrales, psychoses, mal de mer, etc.).

Employé également en radiologie (diagnostic de la sténose cicatricielle, de la sténose spasmodique).

### Posologie :

Au point de vue thérapeutique : 1 à 3 comprimés par jour (5 comprimés maximum).

Au point de vue du diagnostic radiologique : 3 à 4 comprimés une heure avant l'examen à l'écran.

### Présentation :

Tubes de 20 comprimés à 0,02 gr.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province.



## PARATHYROÏDE BIOS

### Composition :

Cachets de 1 milligr., 5 milligr. et 1 cgr. (selon prescription médicale).

Boîtes de 10 ampoules de 1 cc. dosées à 5 mgr. et dosage selon prescription.

### Indications :

Maladie de Parkinson, goitre exophtalmique, éclampsie, tétanie ; convulsions, ulcères gastriques.

### Mode d'emploi :

De 1 milligr. à 1 cgr. deux à trois fois par jour, suivant l'âge, ou une ampoule par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

### La reliure et la brochure d'art

doivent être confiées aux

### ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

**PEBROMON HENRY**

(Flacon de 45 gr.)

Prix : 16 fr. 50.

**Composition :**

Combinaison de brome avec les peptones trysique et érepsique obtenues suivant le même procédé que le pépion Henry.

Absence de propriétés irritantes. N'est pas décomposé par le suc gastrique. A doses moindres, activité plus grande qu'avec les bromures sans en avoir les inconvénients. Goût agréable.

**Dosage :**

Le pebromon Henry est dosé strictement à 0,15 gr. de brome par cc. ou 20 gouttes.

Vingt gouttes répondent moléculairement à 0,25 gr. de bromure en K. et physiologiquement à 0,50 gr. de bromure alcalin.

**Mode d'emploi :**

Doses moyennes : 20 à 40 gouttes deux à trois fois par jour dans de l'eau aux repas. Doses fortes : 100 gouttes trois fois par jour suivant effet.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**PEPIDON HENRY**

(Flacon de 45 cc.)

Prix : 16 francs.

Combinaison de l'iode avec les peptones trypsique et érepsique.  
Gouttes concentrées (0,05 gr. d'iode par vingt gouttes).

**Composé iodique idéal parce que :**

- 1° Dérivant de peptones plus facilement assimilables que la peptone pepsique.
- 2° Son dosage est toujours constant.
- 3° Il n'est pas décomposé par le suc gastrique et n'irrite pas les muqueuses lors de la libération de l'iode.

**Doses :**

20 à 40 gouttes trois fois par jour dans de l'eau aux repas.

Enfants : 10 à 20 gouttes par jour.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

200

**PEPTONATE D'ÉTAÏN HENRY**

(Flacon de 45 cc.)

Prix : 18 francs.

**Composition :**

Solution concentrée de peptonate d'étain (sel parfaitement assimilable parce que combinaison de l'étain avec les peptones trypsique et érepsique), répondant en étain pur à 1,5 %.

**Indications :**

Traitement des maladies à staphylocoques : furoncles, anthrax, panaris, furonculose du conduit auditif, abcès du sein, acné, orgelet, impétigo.

**Mode d'emploi :**

*A l'intérieur :* adultes, 20 gouttes trois fois par jour dans un demi-verre d'eau ; enfants, 10 à 20 gouttes trois fois par jour.

*A l'extérieur :* en application sur un tampon de gaze hydrophile ou en solution dans de l'eau.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**PEPTONE CORNELIS**

(Flacons de 50 cgr.)

**Composition :**

Peptone fabriquée en partant de la viande. Il faut faire la différence entre cette peptone et les nombreuses peptones qui, pour se vendre à meilleur compte, emploient comme matières premières des albuminoïdes végétaux, voire même de la gélatine.

La peptone Cornelis offre de ce côté toutes garanties et le sujet est d'importance surtout pour les traitements par choc anaphylactique

**Indications :**

Anémie en général, troubles de croissance, convalescence, troubles des voies digestives, migraines, urticaires, prurigo, états torpides et chroniques qu'on désignait autrefois sous le nom de scrofule.

**Doses :**

Bébés : 2 cuill. à café par jour.

Enfants : 3 cuill. à dessert par jour.

Adultes : 3 cuill. à soupe par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**PERLES TAPHOSOTE  
LAMBIOTTE FRERES**

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

**Propriétés thérapeutiques :**

Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

**Indications :**

Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré-tuberculose, tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi :**

Cinq perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Littérature et échantillons :

**PRODUITS LAMBIOTTE FRERES**

124, avenue Rogier, Bruxelles

## P H A R M E T A N

### Composition :

1° *Pharmetan pour injections intramusculaires* : Salicylate sodique, hexaméthylène tétramine chimiquement pure, iodure sodique, glucose, eau distillée + une solution anesthésique.

2° *Pharmetan pour injections intraveineuses* : Héxaméthylène tétramine chimiquement pure, iodure et salicylate sodiques, glucose, eau distillée.

### Indications :

Algise et symptômes arthritiques, infections du névraxe, encéphalite léthargique, poliomyélites.

### Posologie :

Injections intraveineuses et intramusculaires. (Voir notices spéciales.)

### Présentation :

1° *Pharmetan pour injections intramusculaires* : Boîtes de 6 ampoules de 5 cc. et de 6 ampoules de 0,5 cc. solution anesthésique (chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol, eau distillée).

2° *Pharmetan pour injections intraveineuses* : Boîtes de 6 ampoules de 10 cc.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division. Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**PHIOGYNE****Composition :**

Poudre boro-thymol salicyl.

**Indications :**

Injections vaginales.

**Doses :**

Antiseptique idéal de valeur éprouvée. Présentation de luxe.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

---

**PHOSPHO-CALCINE**

(Flacon granulé)

**Composition :**

Une cuillerée à café contient : 25 mgr. de glycéroph. de chaux.

**Indications :**

Neurasthénies, névralgies, migraines, anémies, phosphaturie, convalescence, rachitisme, etc.

**Doses :**

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**PHOSOTE LAMBIOTTE FRERES**

Phosphate de créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

**Propriétés thérapeutiques :**

Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

**Indications :**

Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, pré-tuberculose, tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi :**

1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les deux jours, ou 3 cc. tous les trois jours), par cures de vingt et un jours suivies de neuf jours de repos ;

2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : deux par jour.

S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsénicale.

Littérature et échantillons :

**PRODUITS LAMBIOTTE FRERES**

124, avenue Rogier, Bruxelles



## PLACENTA BIOS

### Composition :

Comprimés ou cachets dosés à 0,20 cgr. d'extrait placentaire.

### Indications :

Troubles de la grossesse, vomissements, insuffisance de la lactation et d'involution utérine.

### Mode d'emploi :

2 à 6 par jour.

Flacon de 30 comprimés.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

## POLYPROTEINE BIOS

208

(PROTHEINOTHERAPIE)

### Composition :

Polysérum à base d'albumines non toxiques rendues non anaphylactogènes, pour injections hypodermiques.

### Indications :

Septicémie, infections, rhumatisme, eczéma, psoriasis; urticaire et toutes les indications où la thérapeutique de choc est requise.

### Mode d'emploi :

Cas aigu : une injection par vingt-quatre heures. Cas chronique : une injection tous les huit à quinze jours.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**POLYSERUM**  
**ANTI ASTHMATIQUE « BIOS » A**  
**(TRAITEMENT DE L'ASTHME)**

**Composition :**

Albumines totales, animales et végétales, polyvalentes en milieu physiologique.

**Indications :**

Désensibilisation.

Tous les cas d'asthme essentiel, résistant au Polysérum D. ci-dessous (voie interne voir Anaphylase).

**Contre-indication :**

Affection organique du cœur.

**Mode d'emploi :**

Une injection par huit jours au début, espacer immédiatement à quinze jours et plus, dès que les symptômes s'atténuent.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
 11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**POLYSERUM**  
**ANTI ASTHMATIQUE « BIOS » D**

**Composition :**

Extrait alcoolo-soluble du Polysérum A. ci-dessus.

**Indications :**

Toutes les formes et tous les degrés de l'asthme essentiel.

**Mode d'emploi :**

Une ampoule sous-cutanée par huit jours au début, espacer à quinze jours quand les semaines se passent sans asthme, puis par une injection mensuelle, dans les très bons cas, une petite cure de trois à quatre piqûres hebdomadaires, tous les trois ou tous les six mois.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
 11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## POUDRES DE CROISSANCE VITALES BIOS

Insuffisance pluriglandulaire dans le premier âge.

### Composition :

Thyroïde, surrénale, hypophyse, phosphate ammoniacomagnésien, manganèse de fer.

### Indications :

Asthénie, inappétence, intolérance du lait, athrepsie, retard de la croissance et, en général, dégénérescence et rachitisme provoqués par insuffisance originelle.

### Mode d'emploi :

Chez les nouveaux-nés n'ayant pas leur poids normal et se développant lentement, faire prendre deux comprimés par jour à la nourrice. Chez les athrepsiques, intolérants du lait, délayer un comprimé dans la bouillie préparée uniquement à l'eau et à la Blédine Jacquemaire.

Chez les enfants en retard de développement, tant corporel qu'intellectuel, faire prendre 1 à 2 comprimés par jour.

Flacon de 30 comprimés.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**POUDRES « GYNOL »****Composition :**

Borates. Perborates. Alcalins et bicarbonate de soude. Essence de Lavande, en boîtes de 20 poudres.

**Indications :**

Injections vaginales. Hygiène intime. Hygiène des muqueuses.

**Posologie :**

Une poudre pour 2 litres d'eau bouillie.

**Prix :**

Prix : 20 francs la boîte.

**LABORATOIRES GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

---

**POUDRE OPTIMA**

Poudre de toilette non irritante.

**Indications :**

Contre irritations, rougeurs, crevasses, eczéma.

En application avec houppes.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**P R O M E N Y L (Comprimés)****Composition :**

Extraits de glandes thyroïdes et d'ovaires.

**Indications :**

Troubles de la Puberté chez la femme, Ménopause, Dysménorrhée.

**Doses :**

3 à 6 comprimés par jour. Un ou deux après les repas.  
L'étui de 60 comprimés : 15 fr.

Laboratoire d'Opothérapie U. T. A.

**ETABLISSEMENTS PAUL THIWISSEN**

13, rue Sainte-Véronique, Liège

*Echantillons gratuits sur demande.*

**P R O S T A T I N E B I O S****Composition :**

Comprimés dosés à 0,20 soit 1 gramme de la glande fraîche.

**Indications :**

Impuissance, lésions de la prostate, certains états de dépression nerveuse.

**Mode d'emploi :**

2 à 6 par jour.

Flacon de 30 comprimés.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## PULMASEPTINE BIOS

Traitement des affections des voies respiratoires et des différentes formes de la tuberculose.

### Posologie :

*Boîtes de 10 ampoules de 2,5 cc. contenant : cholestérine, cinname de benzyle, gomenol, eucalyptol, menthol, camphre, huile d'olives 2 cc.*

### Indications :

Tuberculose pulmonaire ouverte, toux, expectoration, râles humides caverne. La laryngite tuberculeuse, la tuberculose cutanée, les bronchites chroniques. Les dilatations bronchiques (crachats fétides abondants). Les bronchites et les broncho-pneumonies chroniques des gazés. Les formes ataxo-adyamiques de la pneumonie, surtout chez les vieillards.

La coqueluche, action remarquable sur les quintes et les vomissements alimentaires qui cessent dès les premières injections même chez les enfants gravement atteints.

### Mode d'emploi :

Chez l'adulte, injecter dans le muscle fessier tous les deux ou trois jours le contenu d'une ampoule.

Chez l'enfant en dessous de 6 mois : injecter une demi-ampoule. Dans le cas de pneumonie et broncho-pneumonie, on peut injecter d'une à deux ampoules par vingt-quatre heures.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

## QUINIO-GOYL

### Composition :

Oxyacétylaminophénylarsinate de quinine.

### Indications :

Toutes les formes aiguës, subaiguës ou chroniques de la malaria. Anémie paludéenne, quinio-résistance, fièvre bilieuse hémoglobi-nurique.

### Posologie :

*Médication préventive* : Chaque matin, une à deux sphérules à 0,25 gr. au moment du repas, pendant quinze à vingt jours consécutifs. Cette cure sera instituée deux à trois fois par an.

*Médication curative* : 4 sphérules à 0,25 gr. jusqu'à disparition de la fièvre, mais sans dépasser dix jours de traitement consécutifs.

*Cures des cas chroniques* : On administrera pendant trois ou quatre séries de dix jours consécutifs quatre sphérules à 0,25 gr. par jour. Ces séries de dix jours seront espacées de cinq ou dix jours de repos, suivant le degré d'infection du cas. Après la désinfection du sang (disparition du plasmodium) il est nécessaire de pratiquer une série supplémentaire de jours de médication

### Présentation :

Flacons de 25 sphérules à 0,25 gr. enrobées de sucre.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**QUINOVARINE OPTIMA**

Sous forme de dragées (48 dragées par flacon)  
et sous forme d'ampoules (10 ampoules de 1 cc.  
par boîte)

**Composition :**

Chaque dragée ou ampoule correspond à 2 cgr. chlorh. de quinine  
et 50 cgr. d'ovaire frais.

**Indications :**

Aménorrhée, chloroanémie des jeunes filles, dysménorrhée, règles  
insuffisantes, troubles psychiques d'origine ovarienne et en général  
toutes les indications de l'ovarine.

**Doses :**

Dragées : 6 par jour, deux à la fois, une heure avant le repas.

Ampoules : série de 10 ampoules en injections intramusculaires,  
à raison de 2 ou 3 par semaine. Repos de quinze jours, puis nou-  
velle série avec nouveau repos.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles



(Traitement des accès de l'asthme par la médication adrénalino-hypophysaire.)

**Composition :**

Solution physiologique renfermant les extraits totaux solubles de la surrénale dosées par cc. à un demi milligramme d'adrénaline naturelle (biorénine) et 25 cgr. d'hypophyse totale.

**Indications :**

Elle est préconisée dans la plupart des formes de l'asthme, excepté l'asthme cardiaque (pour cette affection, voir Euphyllin).

**Mode d'emploi :**

1 à 4 injections par vingt-quatre heures.

**Contre-indication :**

Asthme cardiaque.

Boîte de 6 ampoules de 1,5 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

220

**REPAS BARYTE****Composition :**

Sulfate de Baryum puriss. 150 gr., farine de froment, farine de maïs, sucre vanillé.

**Indications :**

Examens radiologiques.

**Posologie :**

Délayer dans l'eau jusqu'à consistance pâteuse. Chauffer légèrement en ajoutant un peu d'eau ou de lait jusqu'à mélange parfait.

**Présentation :**

Flacons d'origine de 250 grammes environ.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## VACCINATION PAR VOIE CUTANÉE

### SALANTALE

(Pommade-vaccin antiseptique)

#### Composition :

Traitement curatif et préventif des staphylococcies et des pyodermites.

#### Indications :

Infections à base staphylococcique, streptococcique et dans les infections mixtes.

Furonculoses aiguës et chroniques, panaris, orgelets, ostéomyélites, plaies postopératoires purulentes, phlegmons, érysipèles, impétigos contagieux, pyodermites superficielles ou profondes plaies infectées, mastites (abcès du sein), acné pustulente, otites, eczémas humides des seins, oreilles et plis des aïnes (intertrigo).

Traitement préventif contre les mastites quinze jours à trois semaines avant l'accouchement.

#### Mode d'emploi :

1. Pansement avec de la gaze enduite d'une légère couche de Salantale. Renouveler le pansement matin et soir;
2. Pour la vaccination : prendre un peu de Salantale, environ de la grosseur d'une demi-noisette et frictionner légèrement une partie du corps éloignée du mal.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**SALICAIRE HENRY**

(Flacon de 45 cc.)

Prix : 16 fr. 50.

**Composition :**Extrait fluide glycéринé de *Lythrum Salicaria*.**Propriété :**

La Salicaire contient un glucoside dont les propriétés antidysentériques sont nettement établies. Son action sur l'intestin se traduit par une modification des selles qui ne tardent pas à prendre une consistance normale et se désodoriser. Il fait disparaître le sang des selles et produit une modification presque immédiate de la flore intestinale et la disparition des microbes pathogènes.

**Doses :**

50 à 100 gouttes trois fois par jour pour adultes.

Nourrissons : 4 gouttes et plus quatre fois par jour.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**S CAEVOLINE « A »**

Onguent analgésique kératoplastique et antiseptique.

**Indications :**

Spécifique de toutes brûlures. Calme instantanément la douleur, empêche l'infection de la plaie, active la cicatrisation.

**Mode d'emploi :**

En application directe en couche épaisse sur les parties brûlées.

**LABORATOIRES « SCAEVOLA »**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

*Onguent* analgésique et antiseptique énergique.

**Indications :**

Hémorroïdes, ulcères variqueux.

**Mode d'emploi :**

Une ou deux applications par jour .

**SCAEVOLINE « B »**

**SUPPOSITOIRES**

**Indications :**

Hémorroïdes.

**Mode d'emploi :**

Un ou deux supposit. par jour.

**LABORATOIRES « SCAEVOLA »**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

*Echantillons gratuits sur demande.*

---

**Par contrat avec la Maison des Médecins, les**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

accordent 15 % de ristourne sur leurs prix courants

**SEDARSAN**

(Sédatif du système nerveux.)

En solution, à prendre par gouttes.

**Composition :**

Extraits fluides à parties égales : *Crataegus oxyacantha* ; *Ballota foetida* ; *Passiflora incarnata*, les plantes ayant été stabilisées avant l'extraction.

**Indications :**

Palpitations, névroses cardiaques, hyperexcitabilité cardiaque, spasmes, dyspepsies nerveuses, troubles de la ménopause, insomnies, troubles nerveux et psychonerveux, affections spasmodiques et psychopathiques.

**Doses :**

15 à 30 gouttes trois fois par jour ou plus, sur indications strictes du médecin. À prendre avant le repas ou au coucher dans un peu d'eau.

N. B. — Le Sédarsan ne contient aucune substance toxique ou soporifique ; c'est un extrait physiologique végétal. Son action n'est pas immédiate, mais curative.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.:**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**SEL BROWN RAFRAICHISSANT****Composition :**

Sulfate de soude. Bicarbonate de soude. Phosphate de soude.  
Chlorure de soude.

**Indications :**

Laxatif. Dépuratif. Digestif. Vertiges. Désordres bilieux.

**Posologie :**

*Laxatif* : 1/2 cuillerée à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau tiède.

*Dépuratif et digestif* : une pincée un quart d'heure après les trois principaux repas dans un quart de verre d'eau tiède.

**Prix :**

Prix : 7 fr. 50 la boîte.

**LABORATOIRES GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles

**SEL TERWAGNE**

227

**Composition :**

Sulfate de soude et de magnésie effervescente.

**Présentation :**

Poudre soluble effervescente, agréable à prendre.

**Indications :**

Rafraichissant, laxatif, purgatif selon les doses.

**Posologie :**

*Purgatif* : Une cuillerée à soupe dans un verre d'eau fraîche.

*Rafraichissant, Dépuratif* : Une cuillerée à café le matin ou le soir dans un verre d'eau fraîche.

**J. HERMAN, Pharmacien-Chimiste**  
Bruxelles

Concessionnaires :

**Etablissements J. Herman-Labor, S. A.**  
19 à 27, rue des Cultivateurs, Bruxelles

## S E R O C H O L I N E   B I O S

### Composition :

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. contenant 2 cgr. de chlorhydrate de choline chimiquement pur.

### Indications :

Tuberculose dans toutes ses formes et particulièrement les affections externes, adénites, bacillaires, abcès froids, etc.

Dans le cas de tuberculose pulmonaire évolutive et ulcéreuse, des résultats remarquables ont été observés (J. Caries et F. Leuret, 21<sup>e</sup> C. Liège, 1930).

### Mode d'emploi :

Injecter une ampoule tous les deux jours et chez les sujets très amaigris, débiter par une demi-ampoule, soit 1 cgr.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. 15.49.30)

---

**Une reliure « R. I. P. R. A. »**

**éternellement vivra**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

## SÉROTONINE BIOS

### Composition :

**Médication cacodylique à doses massives** en association avec le fluor, manganèse, chlorure de magnésium et strychnine.

### Indications :

Tuberculose, anémie grave, la neurasthénie, chlorose, rachitisme, syphilis, paludisme, convalescence et toutes les maladies où il y a lieu de provoquer la phagocytose.

Traitement des néoplasmes.

### Mode d'emploi :

Est délivrée sous cinq dosages.

*Sérotonine A.* — En ampoules de 1 cc. renfermant chacune 0,10 gr. de cacodylate de soude, un demi milligramme de strychnine. Enfants de 2 à 8 ans.

*Sérotonine B.* — En ampoules de 2 cc. renfermant chacune 0,20 gr. de cacodylate de soude, 1 milligramme de strychnine. Adultes 15 et plus.

*Sérotonine C.* — En ampoules de 3 cc. renfermant chacune 0,30 gr. de cacodylate de soude, 1,5 mm. de strychnine. Adultes, 15 ans et plus.

*Sérotonine D.* — En ampoules de 3 cc. renfermant chacune 0,50 gr. de cacodylate de soude, 1,5 mm. de strychnine. Préconisée dans les affections graves : malaria, paludisme, syphilis.

*Sérotonine E.* — En ampoules de 3 cc. renfermant chacune 1 cgr. de cacodylate de soude, 1,5 milligramme de strychnine délivrée selon prescription spéciale.

Injections sous cutanées ou intramusculaires tous les deux à trois jours avec repos de huit jours.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)



**SERPOLINE (Sirop)****Composition :**

Chl. d'éthylmorph. 0,8 mlgr. p. c. à s.; 0 2 mlgr. p. c. à c.;  
acét. am.-extr. fluides thym et serpolet.

**Indications :**

Coqueluche, rhumes, emphys pulm., bronchites, gripes, etc.

**Doses :**

Sauf autre indication du médecin :

Enfants à partir de 3 ans : 1 cuill. à café par 2 heures.

Enfants à partir de 7 ans : 1 cuill. à dessert par 2 heures.

Adultes : 1 cuill. à soupe toutes les deux heures.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## SERUM NEVROTONE

### Composition :

Glycérophosphate de soude et strychnine en ampoules à doses progressives.

Le sérum Nevrotone est présenté en boîte contenant trois étuis de 10 ampoules chacun (séries 1, 2 et 3).

### Indications :

Asthénie, hypotension, neurasthénie, anémies, lymphatisme, pré-tuberculose, faiblesse constitutionnelle, convalescence.

### Doses :

Une ampoule par jour en injection sous cutanée ou intramusculaire. Commencer par les ampoules de la série I.

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

## SERUM STHENIQUE OPTIMA

(FLACONS COMPTE-GOUTTES)

### Composition :

Glyc. phosph. natr., méthylars. natr. 20 mgr. ; strychn. nit. un demi mgr. par 20 gouttes.

### Indications :

Convalescence, reconstituant, surmenage, anémie cérébrale, phosphaturie, stimulant de la nutrition et de l'assimilation. Ne communique pas à l'haleine et à la transpiration d'odeur désagréable.

### Doses :

Adultes : 3 fois 20 gouttes par jour aux repas.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**SIROP BROMOFORMIQUE HENRY**

(Flacon de 250 cc.)

Prix : 16 francs.

**Composition :**

Sirop d'un goût très agréable contenant par cuill. à soupe : bromoforme 0,02 gr., phosphate de codeine 0,0075 gr., ipéca, 0,009 gr., alcoolature d'aconit 0,0375 gr., benzoate de soude 0,50 gr.

**Indications :**

Calmant, adoucissant expectorant spécialement approprié dans le traitement des rhumes, coqueluches, bronchites, gripes.

**Mode d'emploi :**

A prendre dans de l'eau ou n'importe quel liquide froid, deux heures après les repas ou une heure avant ceux-ci.

Adultes : 3 à 5 cuill. à soupe en vingt-quatre heures.

Enfants de 10 à 16 ans : 3 à 5 cuill. à dessert.

De 5 à 10 ans : 3 à 5 cuill. à café.

Enfants plus jeunes : faire un mélange d'une cuill. à coupe dans trois d'eau ou de sirop de tolu et donner par cuill. à café toutes les heures ou deux heures, suivant âge.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

## SIROP DE KOLA COMPOSE HENRY

234

(Flacon de 187 cc.)

Prix : 16 fr. 50.

### Composition :

Kola fraîche stabilisée : quinquina, extrait de noix vomique (4 milligrammes par cuill. à café), glycerophosphate de soude.

### Propriétés thérapeutiques :

Excitant musculaire, reconstituant du système nerveux, tonique général.

### Indications :

Neurasthénie, dépression mentale, grippe et convalescence des maladies infectieuses, troubles fonctionnels cardiaques ; asthénie, surmenage intellectuel et physique.

### Doses :

Adultes : 3 cuill. à café par jour suivies d'une gorgée d'eau.

Enfant : 1/2 cuiller à café de 1 à 3 fois par jour suivant âge.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

## SIROP D'HEMOGLOBINE METHYLARSINE HENRY

235

(Flacon de 250 cc.)

Prix : 16 fr. 50.

Seule préparation à base d'hémoglobine fournissant à l'organisme l'équivalent assimilable de 0,10 gr. de fer métallique par jour.

### Composition :

Hémocristalline 10 % ; peptonate de fer Henry Q. S. pour arriver à une dose de 0,10 gr. de fer métal de fer pro die. Méthylarsinate de soude 0,02 gr. par cuill. à soupe.

### Doses :

Adultes : 3 cuill. à soupe par jour.

Enfants de 5 à 10 ans : 3 cuill. à café.

Enfants de 10 à 16 ans : 3 cuill. à dessert.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

## SIROP JACKSON

### Composition :

Aux hypophosphites solubles de calc. kal. nat. fer et mangan. nux vom. et chin.

### Indications :

Neurasthénie, convalescence, croissance rapide, surmenage intellectuel, maladies osseuses, rachitisme.

### Doses :

Enfants de 7 ans : 3 demi-cuill. à café par jour.

Adultes : 3 cuill. à café par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**  
78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

---

## SIROP MORY

### Composition :

Ethylmorph. chl. 0,8 mlgr. p. c. à c. ; 3 mlgr. p. c. à s.

Cocaïn. chl. 0,35 mlgr. p. c. à c. ; 1,3 mlgr. p. c. à s.

Teint. acon. 4/5 gouttes p. c. à c. ; 3 gouttes p. c. à s.

Méthyl. nat. 5,33 mlgr. p. c. à c. ; 20 mlgr. p. c. à s.

Gaïacol et sirop.

### Indications :

Rhumés négligés, bronchites, grippe, asthme, catarrhes.

### Doses :

Enfants à partir de 3 ans : 3 cuillerées à café par jour.

Enfants à partir de 7 ans : 6 cuillerées à café par jour.

Adultes : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**  
78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**SOLIFEINE****Composition :**

Solution stable d'iodure de caféine.

Une cuillerée à café contient 0,50 d'iodure de caféine.

**Doses :**

Diurétique et tonique du cœur et des voies respiratoires.

Asthme : enphyseme.

Action rapide et tolérance parfaite.

**Indications :**

1 cuill. à café matin et soir ou au commencement des repas.

**LABORATOIRE DANDROY**

161, rue Royale-Sainte-Marie, Bruxelles

**SOLUTION HENRY**

(Flacon de 250 cc.)

Prix : 17 francs.

**Composition :**

Renferme par cuillerée à soupe 2 grammes de salicylate de soude chimiquement pur (obtenu par recristallisations successives) dissous dans une solution bicarbonatée d'un goût très agréable.

Le salicylate ainsi présenté est beaucoup mieux supporté.

**Dosage :**

1 cuill. à soupe = 2 gr. de salicylate de Na.

1 cuill. à café = 0,666 gr. de salicylate de Na.

**Mode d'emploi :**

Dans les cas de rhumatismes aigus, 2 à 3 cuill. à soupe par jour dans une grande tasse d'infusion de tilleul de frêne ou de queues de cerises pour éviter l'accumulation et favoriser la diurèse rénale.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

240

**SPHEROÏDS MEURICE****Composition :**

Nouvelle présentation du chlorhydrate de quinine à taux fixe de quinine base.

**Indications :**

Paludisme.

**Posologie :**

*Per os.* (Voir notre brochure : *Les sels de quinine.*)

**Présentation :**

Flacons de 100 sphérules à 0,05 gr. de chlorhydrate de quinine.

Flacons de 100 sphérules à 0,10 gr. de chlorhydrate de quinine.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

## STANNOBARDANE HENRY

Association du *Peptonate d'étain* avec l'extrait de *racine fraîche de bardane stabilisée*.

Est présenté sous deux formes :

A. — STANNOBARDANE HENRY SOLUTION. *Peptonate d'étain* titré à 0,01 gr. d'étain pur par 60 gouttes. *Bardane fraîche*.

Prix : 16 fr. 50.

### Doses :

Adultes : 60 à 100 gouttes trois fois par jour.

Enfants : 4 gouttes par année d'âge trois fois par jour.

B. — STANNOBARDANE HENRY PILULES. Chaque pilule équivaut à 0,015 gr. d'étain pur sous forme de *peptonate associé à la bardane*.

Prix : 19 francs.

### Doses :

Adultes : 3 à 6 par jour.

### Propriétés thérapeutiques :

Cessation du prurit ; atténuation de l'inflammation ; diminution de la tension ; furoncles mûrs s'affaissent et palissent ; résorption du bourbillon ; arrêt de la suppuration ; furonculose avec rares furoncles guérie en trois ou quatre jours.

### Indications :

Toutes les maladies à staphylocoques.

### LABORATOIRES HENRY

Rue de Sclessin, 39, Liège



**STANNOLIP HENRY**

(Flacon de 40 pilules)

Prix : 16 fr. 50.

**Composition :**

Peptonate d'étain (étain métal 0,031 gr.) ; peptonate du cuivre (cuivre métal 0,001 gr.) ; cholestérine-lecithine.

**Action thérapeutique :**

Traitement des maladies à staphylocoques et à streptocoques associés, par le peptonate d'étain et de cuivre.

L'action spécifique de ces deux métaux étant renforcée suivant les travaux de Hudelo, Montlaur, Drouin et Hérain par l'adjonction de lipoides.

**Indications :**

Toutes les maladies à staphylocoques ou à association de staphylocoques et de streptocoques, acnés, etc.

**Doses :**

3 pilules par jour aux repas.

**LABORATOIRES HENRY**

Rue de Sclessin, 39, Liège

**STAPHYLOVACCIN U. T. A.**

Emulsion de staphylocoques polyvalents.

**Indications :**

Furoncles. Anthrax, Impetigo, Sycosis. Infections staphylococques.

Une ampoule en injection sous-cutanée tous les deux jours.

Cinq concentrations différentes :

Dosage I = 60 millions de microbes par centimètre cubes.

Dosage II = 125 millions de microbes par centimètre cubes.

Dosage III = 250 millions de microbes par centimètre cubes.

Dosage IV = 500 millions de microbes par centimètre cubes.

Dosage V = 1 milliard de microbes par centimètre cubes.

Laboratoire d'Opothérapie U. T. A.

**ETABLISSEMENTS PAUL THIWISSEN**

13, rue Sainte-Véronique, Liège

*Echantillons gratuits sur demande.*

## SUPPOSITOIRES « GYNOL » ANTIHEMORROIDAUX

Prix : 20 francs.

Percaïne « Ciba », 2 cgr. 50 ; acide gallique, 10 cgr. ; oxyde de zinc, 15 cgr. ; beurre de cacao, q. s. pour 1 supp., associés.

### Suppositoires « Gynol » à toute formule spéciale

à la demande de MM. les médecins.

**LABORATOIRES GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles, Bruxelles.

## SUPRARENIDINE OPTIMA

(Adrénaline)

### Composition :

La Suprarénidine Optima est le principe actif extrait des glandes surrénales. Ce produit est délivré en solution à 1/1000 par flacons spéciaux de 10 et 30 grammes. Il existe également en ampoules dosées à un demi milligramme et 1 milligramme par cc.

### Indications :

Crises d'asthme bronchique, hémoptysie, chirurgie dentaire, hémorragies gastro-intestinales, néphrites hémorragiques.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## SURRENALE BIOS

### Composition :

Comprimés ou cachets dosés à 20 ctgr. d'extrait total de glande surrénale = 1 gramme de glande fraîche.

### Indications :

Troubles cardio-vasculaires; hypotension avec pouls faible et instable; quelquefois tachycardie, arythmie, syncope, hypothermie, cyanose des extrémités, sensation de froid, ligne blanche de Sergent.

### Mode d'emploi :

Deux ou quatre comprimés par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## SURRENALE BIOS INJECTABLE

### Composition :

Ampoules de 1 cc. extrait surrénal total en solution physiologique titrée.

### Indications :

Troubles cardio-vasculaires; hypotension avec pouls faible et instable; tachycardie, arythmie, syncope, hypothermie, cyanose des nase des extrémités, sensation de froid, ligne blanche de Sergent; diphtérie.

### Mode d'emploi :

1 à 3 injections hypodermiques par jour.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**THIOSOTE LAMBIOTTE FRERES**

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassimu et de teintures de Lobèlle et de Drosera.

**Propriétés thérapeutiques :**

Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

**Indications :**

Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires.

**Mode d'emploi :**

Adultes : 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : à partir de 3 ans, 4 cuillerées à café par jour, à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

Nourrissons : 25 à 50 gouttes par jour, selon l'âge par prise de 5 à 10 gouttes mélangées au lait.

Littérature et échantillons :

**PRODUITS LAMBIOTTE FRERES**

124, avenue Rogier, Bruxelles

## THYROIDINE BIOS

### Composition :

Comprimés dosés à 10 cgr. de thyroïdine standardisée égale à 50 cgr. de la glande fraîche.

### Indications :

Cachexie, sénilité précoce, épilepsie, troubles de croissances, asthme, obésité, rhumatismes chroniques, dermatose, calvitie, migraine, constipation, myxoedème, retard intellectuel.

### Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : de 0,01 à 0,10 cgr. par jour suivant le cas.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

250

## THYROIDINE BIOS INJECTABLE

### Composition :

Ampoules de 2 cc. renfermant chacune l'extrait de 50 cgr. de glande fraîche.

### Indications :

Cachexie, sénilité précoce, épilepsie, troubles de croissance, asthme, obésité, rhumatisme chronique, dermatose, calvitie, migraine, constipation, myxoedème, retard intellectuel.

### Mode d'emploi :

1 à 3 comprimés par semaine.

Boîte de 10 ampoules de 2 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## THYROIDINE MEURICE

### Composition :

Extrait total thyroïdien.

### Indications :

Myxœdème infantile (congénital ou tardif), idiotie myxœdéma-teuse, myxœdème de l'adulte, croissance retardée, cryptorchidie.

La Thyroïdine sera également prescrite chez les obèses et les hypotendus cyanosés (insuffisance thyroïdienne).

### Posologie :

Au début, un demi à un comprimé par jour chez l'adulte : un quart à un demi comprimé chez l'enfant. Progressivement, en quatre ou cinq jours, on pourra atteindre les doses quotidiennes de 3 à 5 comprimés et même plus, chez l'adulte; 1 à 2 chez l'enfant. En général, après dix ou douze jours de traitement, on interrompt pendant cinq jours. Après amélioration, diminuer les doses puis restreindre la médication de deux jours à un jour par semaine, puis un jour par mois. Surveiller le cœur pendant les cures.

### Présentation :

Flacons de 50 comprimés à 0,20 gr.

Un comprimé correspond à 0,30 gr. d'organe frais.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## THYROVARINE BIOS

### Composition :

Comprimés ou cachets dosés à 20 cgr. d'ovarine et 5 cgr. de thyroïdine.

### Indications :

Insuffisance thyro-ovarienne dans les troubles du myxœdème qui accompagnent la ménopause compliquée d'insuffisance thyroïdienne; obésité, asthme.

### Mode d'emploi :

2 à 3 comprimés ou cachets par jour.  
Flacon de 30 comprimés.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

253

## THYROVARINE INJECTABLE BIOS

### Composition :

Extrait total de l'ovaire associé à la thyroïde en solution physiologique et contenant les principes actifs de 1 gramme d'ovaire et 25 cgr. de thyroïde frais.

### Indications :

Insuffisance thyro-ovarienne dans les troubles du myxœdème qui accompagnent la ménopause compliquée d'insuffisance thyroïdienne; obésité, asthme.

### Mode d'emploi :

Deux à six injections par semaine.  
Boîte de 10 ampoules de 2 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**TREPOCIDINE**

(Ampoules) Boîte de 10

**Composition :**

Hydroxyde de bismuth en suspension huileuse. Existe en deux dosages : amp. de 15 et 30 cgr.

**Indications :**

Médication : antisiphilitique.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

**TRI-ZYMOL**

(Granulé)

**Composition :**

Pepsine, pancréat. diast.

**Indications :**

Dyspepsie, anorexie, aepsie.

**Doses :**

1 cuill. à café après chaque repas.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles



**TRYPONARSYL****Composition :**

Paraglycinamide phénylarsinate de sodium.

**Indications :**

Trypanosomiase humaine (maladie du sommeil).

**Posologie :**

Le Tryponarsyl est injecté de préférence par voie intraveineuse; les voies sous-cutanée ou intramusculaire sont pourtant aussi utilisables.

La dose de Tryponarsyl ne doit pas dépasser 0,04 à 0,05 gr. par kilogramme de poids et un total de 3 grammes par dose pour un adulte de corpulence moyenne.

Fréquemment, on débute par une dose un peu plus faible, soit, pour les adultes, 1,50 à 2 grammes.

L'intervalle minimum entre les doses est d'une semaine et la série compte huit à seize doses; on donne deux semaines à deux mois de repos entre les deux séries. La quantité totale de produit injecté dépend de l'état du malade et des effets du traitement.

**Présentation :**

Flacons de 50 et 100 grammes.

Ampoules de 1, 2, 3 grammes et autres sur demande.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## TRYPONARSYL

### Composition :

Paraglycinamide phénylarsinate de sodium + salicylate de mercure

### Indications :

Neuro-syphilis (cures).

### Posologie :

Pour les doses de Tryponarsyl à utiliser, voir la rubrique Tryponarsyl.

Pour les doses à utiliser, voir la rubrique Tryponarsyl.

Injections intramusculaires.

Trois jours avant chaque injection de Tryponarsyl, on injecte 0,065 gr. de salicylate de mercure dans la fesse.

### Présentation :

Boîte de 8 ampoules de 3 grammes de Tryponarsyl et de 8 ampoules de 0,065 gr. salicylate de mercure.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

### Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

**URENILE (Comprimés)****Composition :**

Hexaméthylène tétramine chimiquement pure.

**Indications :**

Antiseptique interne. Affections des voies urinaires : cystite, pyélo-néphrite, urétrite aiguë, bactériurie.

Coryza, pharyngite aiguë, laryngotrachéite.

Antiseptique intestinal : convalescence de la fièvre typhoïde.  
Dermatoses.

**Posologie :**

Deux à quatre comprimés par jour.

**Présentation :**

Tube de 20 comprimés à 0,50 gr.

Flacons d'origine de 50 comprimés à 0,50 gr.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**Composition :**

Hexaméthylène tétramine chimiquement pure, bicarbonate sodique, acide tartrique, saccharose.

**Indications :**

Microbicide interne. Antiseptique urinaire. (Voir indications de l'Urénilé comprimés.)

**Posologie :**

1 à 2 ou 3 grammes d'Urénilé pur par jour en deux ou trois prises, une demi-heure avant le repas.

**Présentation :**

Flacons de 75 et 190 grammes.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

**Demandez le tarif des prix  
courants de reliure aux**

**ETABLISSEMENTS R. I. P. R. A.**

Société anonyme

106, rue Malibran, 106

**BRUXELLES (Tél. 48.35.31)**

## U R E N I L E (Injectable)

### Composition :

Hexaméthylène tétramine chimiquement pure en solution aqueuse stérile.

### Indications :

Infections uro-génitales : pyélo-néphrites, cystites, pyo-salpinx, épiphyditites, ovarites, métrites, vaginites, abcès pelviens, phlegmons profonds.

Pyorrhée dentaire sinusites aiguës, etc.

Septicémies : Grippe et ses diverses localisations, pneumonie, franche, broncho-pneumonie; septicémies streptococciques, etc.

Acidose diabétique. Dermatoses.

### Posologie :

Injections dans le muscle et par voie endoveineuse. (Voir notice spéciale.)

### Présentation :

Boîtes de 12 ampoules à 0,50 gr.

Boîtes de 12 ampoules à 1 gramme.

Boîtes de 12 ampoules à 1,50 gr.

Boîtes de 12 ampoules à 2 grammes.

Boîtes de 6 ampoules à 0,50 gr.

Boîtes de 6 ampoules à 1 gramme.

Boîtes de 6 ampoules à 1,50 gr.

Boîtes de 6 ampoules à 2 grammes.

### UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »

Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles

Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

et dépôts de province

## URETHRO-CAPSULES GYNOL

### Composition :

Argyrol « Barnès », 0 gr. 125 ; aqua dist., 5 gr. ; pro caps. gelat. un.

### Indications :

Infections urétrales. Blennorrhagie. Tant comme traitement abortif que comme traitement des cas de gonorrhée aiguë ou chronique.

### Mode d'emploi :

Ouvrir la capsule à l'extrémité extérieure du col effilé en pinçant la pointe avec l'ongle ou en la coupant avec des ciseaux.

Ensuite expulser l'air avec précaution et même faire sortir quelques gouttes de la solution.

Chasser le contenu de la capsule dans le canal de l'urètre par une légère pression. Tenir l'orifice du canal urétral fermé durant quelques minutes au moyen du pouce et de l'index.

### Posologie :

Une ou plusieurs injections urétrales par jour (suivant avis du médecin).

Prix : 24 fr. la boîte de six capsules.

**LABORATOIRE GYNOL**

316, chaussée d'Ixelles.

**UROMETINE LAMBIOTTE Frères**

Hexaméthylènetétramine pure.

**Formes :**

Comprimés, ampoules, cristaux.

**Propriétés thérapeutiques :**

Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

**Indications :**

Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

**Mode d'emploi :**

1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques :

2° Ampoules de 3 et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ;

3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Littérature et échantillons :

**PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES**

124, avenue Rogier, Bruxelles

## VACCIN ANTI ASTHMATIQUE BIOS

### Composition :

Cultures de souches isolées de nombreux cas d'asthme strepto-hémolyt. staphylo Pfeiffer Micr. catarrh., pneumocoques additionnées de protides désensibilisants.

### Indications :

Asthme dont l'origine microbienne est établie (pour l'asthme essentiel pur, voir protéinothérapie, polysérums du D<sup>r</sup> Brabant A et D.).

### Mode d'emploi :

Débuter par 0,2 cc. en augmentant tous les six jours jusqu'à 1,5 cc. (Pas d'injections pendant les crises.)

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

264

## VACCIN ANTIBRONCHITIQUE ANTIGRIPPAL BIOS

### Composition :

Lysas de cultures polyvalentes de staphylocoques strepto. Hémolytiques, pneumoc. friedlander pfeiffer microc. catarrhalis, colibacilles et entérocoques.

### Indications :

Grippe, bronchite, broncho-pneumonie, pleurésie, endocardite, sinusite, otite, complications pulmonaires, rougeole et interventions chirurgicales (préventive).

Traitement des infections associées à la tuberculose pulmonaire.

### Mode d'emploi :

Formes aiguës : injections journalières de 1 à 2 cc.

Forme chronique : débuter par 0,2 cc. et progressivement tous les quatre à cinq jours.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)



## VACCIN ANTICOLIBACILLAIRE BIOS

### Composition :

Colibacilles de souches polyvalentes intestinales et urinaires, 500 millions; *Fœcalis alcaligène*, 150 millions.

### Indications :

Entérites, toxémies, septicémies colibacillaires, grippe intestinale, pyélite, pyélonéphrite, entérocolites. (Voir entérocolibacilline.)

### Mode d'emploi :

Débuter par 0,2 c.c et progressivement selon les réactions, tous les cinq à six jours.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

## VACCIN ANTIGONOCOCCIQUE BIOS

### Composition :

Série I : gonocoques, 250 millions; série II : gonocoques, 750 millions.

### Indications :

Complications blennorragiques, orchites, épидидymite, arthrite, endocardite, métrite, salpyngite.

### Mode d'emploi :

Deux injections par semaine de 0,5 à 1,5 cc. en débutant par la série I.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

267

## VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE BIOS

### Composition :

Pneumocoque, 750 millions : friedlander, germes isolés de cas de pneumon. bronch., etc., dont la virulence a été exaltée par passage sur souris.

### Indications :

Pneumonie lobaire, pleuro-pneumonie, pleurésie, broncho-pneumonie.

### Mode d'emploi :

Débuter par un demi cc. et augmenter journallement, progressivement selon la réaction thermique.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

---

268

## VACCIN ANTIPYOGENE ANTIPYORRHEIQUE BIOS

### Composition :

Staphylo blanc et dorés 1 milliard; streptocoques hémolytiques et vir. 500 millions ; bacille pyocanique 500 millions par cc.

### Indications :

Infections pyogènes et suppurations en général, panaris, adénites, phlegmons ostéomyélite pyorrhée alvéolo dentaire.

### Mode d'emploi :

Cas aigus injections journalières de 0,2 cc. à 1,5 cc.; cas chronique, injections de 0,5 à 1,5 cc. deux à trois fois par semaine.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**VACCIN  
ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
BIOS**

**Composition :**

Souches polyvalentes de staphylos blancs, dorés et citrins.  
1,200 millions de cc.

**Indications :**

Furonculose, anthrax, acné, folliculite, abcès, phlegmon, ostéo-myélites, etc.

**Mode d'emploi :**

Injections combinées intradermiques et sous-cutanées d'un demi à un et demi cc. tous les trois ou quatre jours.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**VACCIN  
ANTISTREPTOCOCCIQUE  
BIOS**

270

**Composition :**

Filtrat de culture sur bouillon sérum de streptocoques hémolytiques et non hémolytiques additionné de 750 millions de germes par cc.

**Indications :**

Érysypèle, scarlatine, fièvre puerpérale, impétigo mammitte, pleurésie purulente, septicémie, abcès profonds, suppurations chirurgicales.

**Mode d'emploi :**

Deux à six injections par semaine, de 0,5 à 1,5 cc. selon le cas.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**V A C C I N**  
**S T R E P T O - S T A P H Y L O C C O C C I Q U E**  
**B I O S**

**Composition :**

Staphylo blanc et dorés 1 milliard; streptocoques hémolyt. et virid. 750 millions de cc.

**Indications :**

Sycosis, érésypèle, furoncles, anthrax ostéomyélite, sinusite septicémie.

**Mode d'emploi :**

Deux à six injections par semaine, de 0,5 à 1,5 cc. selon cas et réaction.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**V A C C I N A N T I R H U M A T I S M A L**  
**B I O S B**

**Composition :**

Lysas de cultures isolées de cas de rhumatismes, strept. vir., strepto-hémolyt. entérocoques et coli additionnées de protéine de choc.

**Indications :**

Rhumatismes aigus, rhumatismes articulaires aigus et musculaires.

**Mode d'emploi :**

Injections journalières, puis trihebdomadaires en débutant par 0,2 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## VACCIN ANTIRHUMATISMAL BIOS I

### Composition :

Même formule additionnée de 0.20 d'iodotropine (iodobenzo hexaméthylène tétramine), soit 0,08 d'iode m.

### Indications :

Rhumatisme chronique déformant, goutte artério-sclérose où une médication iodée complémentaire est indiquée.

### Mode d'emploi :

Injection hebdomadaire de 0,5 à 2 cc. progressivement.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

## VACCIN ANTIRHUMATISMAL BIOS G

### Composition :

Même formule que le B. additionné de cultures polyvalentes de gonocoques.

### Indications :

Rhumatismes gonococcique et toutes les complications blennorragiques.

### Mode d'emploi :

Semblable au vaccin B.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

**VACCIN ANTITYPHIQUE BIOS****Composition :**

Bacille typhique, 1200 millions; bacille paratyphus A, 300 millions; bacille paratyphus B, 800 millions par cc.

**Indications :**

Spécifique préventif de la fièvre typhoïde, à titre curatif, empêche les complications et agit favorablement sur le cours de la maladie.

**Mode d'emploi :**

Deux à trois injections en débutant par un demi cc. en huit jours, puis quinze jours d'intervalle. Curatif : tous les jours, de 0,1 cc. à 0,5 cc.

(Pour la vaccination per os, voir vaccins Bilies.)

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

## LES VACCINS BILIES PER OS

(MÉTHODE DE BESREDKA)

### ENTEROCOLIBACILLINE BIOS

Deux formes : pilule ou liquide.

#### A) ENTEROCOLIBACILLINE en pilules

##### Composition :

Entérocoques, 20 milliards ; colibacilles, 20 milliards poudre de duodénum 10 cgr.

En pilules kératinisées ne se désagrègent qu'au niveau de l'intestin grêle.

##### Indications :

Infections gastro-intestinales d'origine microbienne, gastro-entérite, la colite, la pyélonéphrite, la pyélite infantile, la cystite, la cholécystite, les congestions hépatiques, l'ictère catharral, colibacillurie, infection chez les femmes gravides.

##### Mode d'emploi :

Prendre le matin à jeun une pilule de Bile (verte) et une demi-heure après une pilule d'Entérocolibacilline noire; puis tous les jours ou tous les deux jours, suivant l'évolution du processus (aigu ou chronique), deux pilules de bile suivies une demi-heure après de deux pilules d'Entérocolibacilline (noire). Les enfants ne prennent qu'une pilule de bile et une pilule de vaccin par jour.

Premier tube : 12 pilules de bile (verte).

Deuxième tube : 12 pilules kératinisées de vaccin.

#### B) ENTEROCOLIBACILLINE liquide

##### Composition :

Boîte contenant :

1° Pilules extrait biliaire à 10 cgr.

2° Huit ampoules de 5 cc: de bouillon: colibacilles, 6 milliards;

streptocoques, 5 milliards ; foecalis alcaligenis, 1 milliards ; staphylocoques, 5 milliards.

### Indications :

Les mêmes qu'en pilules. (Nos laboratoires préparent également les autovaccins *per os*.)

### Mode d'emploi :

Prendre le matin à jeun deux pilules de bile et une demi-heure après avaler le contenu d'une ampoule dans un peu d'eau tiède. Même opération tous les jours dans les cas aigus ; deux ou trois par semaine dans les cas chroniques.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

### Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques  
11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

---

277

## VACCINS BILIES « BIOS »

## ANTITYPHIQUE ET PARA A ET B

### Composition :

1. Une pilule de bile de 10 cgr. (verte) ;
2. Une pilule de vaccin kératinisé (noire) ;  
renfermant : bacilles typhiques : 60 milliards ; bacilles paratyphiques A : 20 milliards ; bacilles paratyphiques B tués : 40 milliards.

### Indications :

Agent préventif d'une efficacité incontestable dans la fièvre typhoïde et dans les affections paratyphiques. Spécialement là où la vaccination sous-cutanée est contre-indiquée, refusée par la



population ou d'application difficile, dans les grandes ou petites agglomérations à vacciner en bloc, dans les épidémies de typhoïde, les hôpitaux, sanatoria, pensionnats, bateaux, écoles, et dans les régions éloignées de tout centre médical, les colonies, le Congo belge.

### **Mode d'emploi :**

Prendre le matin à jeun une pilule de bile (verte) une demi-heure après une pilule de vaccin (noire). Repas demi-heure après. Aucune contre-indication. Doses spéciales pour enfants.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15.49.30)

## VASCULARINE (GYNOL)

### Composition :

1 cc. contient : iode 2 cgr. ; iodure de soude 20 cgr. ; extrait total d'hamamelis 50 cgr.

### Indications :

- 1° Maladies du cœur et de la circulation ;
- 2° Maladies des veines, phlébites, varices, hémorroïdes, etc.
- 3° Maladies des viscères à point de départ circulatoire ;
- 4° Troubles circulatoires de la puberté et de la ménopause.

### Posologie :

Adultes : 20 à 40 gouttes deux à trois fois par jour aux repas dans un peu d'eau.

Enfants : demi-dose.

### Prix :

Prix : 20 francs le flacon.

LABORATOIRES GYNOL, 316, chaussée d'Ixelles

## VASOL

### Composition :

Nous présentons également au corps médical sous le nom de Vasol l'huile de paraffine spécialement destinée à l'usage interne.

### Indications :

Sont les mêmes que celles du Vasol agar. Il est présenté en flacon de 250 cc.

### Mode d'emploi :

Une cuillerée à café à trois cuillerées à soupe par jour, selon l'âge et suivant les indications.

M. et H. COUTELIER FRERES

Produits « Bios »

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**VASOL AGAR****Composition :**

Emulsion d'huile de paraffine spécialement préparée pour l'usage interne avec agar-agar.

**Indications :**

Traitement de la constipation opiniâtre, entérite, Stase intestinale.

**Mode d'emploi :**

Action proportionnelle à la dose prise, une cuillerée à café à trois cuillerées à soupe par jour selon l'indication.

Le *Vasol Agar* est le laxatif de choix après une intervention chirurgicale.

Le *Vasol Agar* est un liquide laiteux agréablement aromatisé, est accepté volontiers par les malades les plus difficiles.

Flacon de 250 cc.

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**V E S P E R A L****Composition :**

Acide diéthylbarbiturique chimiquement pure.

**Indications :**

Hypnotique. Sédatif du système nerveux.

Neurasthénie, hypocondrie, psychoses d'épuisement, état de dépression, insomnie consécutive à une commotion cérébrale, maladie du système nerveux de l'enfance, etc.

**Posologie :**

Sauf avis contraire du médecin, la dose maxima est de 1 comprimé à 0,50 gr., par jour, pour un adulte; pour les enfants, la dose sera réduite à un demi-comprimé.

**Présentation :**

Tubes de 10 comprimés à 0,50 gr.

**UNION CHIMIQUE BELGE, S. A.**

Division : Produits Pharmaceutiques « Meurice »  
Usine et Laboratoires : 68, rue Berkendael, Bruxelles  
Département Scientifique : 61, avenue Louise, Bruxelles

Agent de vente exclusif :

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles  
et dépôts de province

## VIN MORY

### Composition :

Principes actifs des feuilles de coca, noix de kola et cacao (cocaïne, caféine).

### Indications :

Stomachique, tonique, reconstituant, anémie, chlorose neurasthénie, surmenage, intell. et physique.

### Doses :

Adultes : un verre à vin après chaque repas.

Enfants : un demi verre à vin après chaque repas.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

---

## VIN OOPHORINE

### Composition :

A base d'extrait ovarique.

### Indications :

Troubles généraux et métrorrhagies de la ménopause naturelle. Accidents aigus de la ménopause artificielle, chirurgicale ou postopératoires; troubles de l'insuffisance génitale; affections mentales, accompagnant ou dérivant des lésions génitales.

### Doses :

1 à 2 verres à liqueur par jour.

**LABORATOIRES « OPTIMA », S. A.**

78-80, Grande rue au Bois, Bruxelles

## VITAMORRHUINE

### Composition :

Vitamines A et D. Phosphore et calcium. Présentée sous forme de granulés au cacao.

La Vitamorrhaine constitue une préparation idéale contenant les principes actifs de l'huile de foie de morue incorporés à un véhicule qui en fait un aliment agréable.

L'action de la Vitamorrhaine est contrôlée biologiquement.

### Indications :

Rachitisme, tuberculose, débilité, dénutrition.

### Doses :

Enfants de 3 mois à 1 an : une cuillerée à café par jour à prendre dans du lait.

De 1 an à 5 ans : deux cuillerées à café par jour (à croquer ou à prendre dans un liquide, lait, cacao, etc.).

De plus de 5 ans : trois cuillerées à café par jour.

Adultes : quatre cuillerées à café par jour.

Préparé dans les Laboratoires de la

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

## VITERGOMINE

### Composition :

Préparation d'Ergostérol irradié dissous dans l'huile d'olive. Cette solution de vitamine D pure dans l'huile d'olive est incorporée au saccharure de glycérophosphate de chaux à 5 %. Cette préparation est vérifiée au point de vue de son activité biologique.

### Indications :

Rachitisme, ostéomalacie, tuberculose, carie dentaire, anémie, lymphatisme, et à titre préventif aux femmes pendant la période de gestation et de l'allaitement.

### Doses :

Par cuillerées à café de 1 gramme environ de granulés.

Enfants : jusqu'à 5 ans, une cuillerée à café par jour; de 5 à 10 ans, deux cuillerées à café par jour; de plus de 10 ans et pour les adultes, trois cuillerées à café par jour.

**PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone, Bruxelles

## BACTERIOPHAGE ANTICOLIBACILLAIRE « BIOS »

Chaque boîte contient six ampoules de bactério-anticoli. Chacune de ces ampoules renferme un bactériophage différent, quoi qu'ils soient, individuellement, très polyvalents et très virulents, c'est-à-dire aptes à détruire de nombreuses souches différentes de colibacilles à la fois.

### Mode d'emploi :

Deux ampoules de bactériophage, matin et soir, dans un verre d'eau, pendant six jours.

### Indications :

Toutes les colibacilloses, entérites aiguës ou chroniques, *colibacillémie*, et en général toutes les infections où se germe entre en cause : pyélite, pyélanéphrite, cystite, péritonites, etc.

## BACTERIOPHAGE ANTITYPHIQUE « BIOS »

para A et B)

### Indications :

Traitement curatif de la fièvre typhoïde et affections para A et B en pleine évolution. Désinfection des porteurs de germes. Pas de contre-indication.

### Mode d'emploi :

Deux ampoules matin et soir dans un verre d'eau, pendant six jours.

Boîtes de six ampoules, 5 cc. pour usage interne.



**BACTERIOPHAGE  
ANTIDYSENTERIQUE  
ANTISHIGA & FLEXNER « BIOS »**

**Indications :**

Dysenteries bacillaires aiguës et chroniques, porteurs de germes.

**Mode d'emploi :**

Une ampoule, le matin à jeun, dans un verre d'eau, pendant six jours.

*Nota.* — J. M. de Costa Cruz, de l'Institut Oswaldo Cruz, du Brésil, dans sa communication à la Société de Biologie, du 14 juin 1924, résume les observations faites au Brésil pendant ces dernières années. Jusqu'à présent, dix mille boîtes de bactériophages ont été distribuées aux médecins directeurs des services de prophylaxie rurale, avec des résultats très heureux. Voici ses conclusions :

« Le bactériophage dysentérique est de beaucoup le meilleur agent thérapeutique des dysenteries bacillaires jusqu'à présent connu. »

**M. et H. COUTELIER FRERES**

**Produits « Bios »**

Laboratoire belge d'Applications biologiques

11 et 37, rue De Potter, Bruxelles (Téléph. : 15,49,30)

**Comptoir Belge d'Appareils de Prothèse,  
d'Orthopédie, Ceintures et Chaussures**

---

---

**Joseph POTVIN & Cie**

Ex-Chef des Ateliers de la Croix-Rouge (Pr. Depage)

Fournisseur agréé de l'Œuvre Nationale des Invalides, Hôpitaux  
et Compagnies Assurances

Spécialités de prothèse en dur aluminium  
et nidrose du Dr Reverdin

212, Rue Rogier, Schaerbeek-Bruxelles, tél. 15.14.33

Un médecin a besoin d'une voiture sur laquelle il peut compter. — Les voitures

**“minerva,”**

sont des autos solides, nécessitant le **minimum d'entretien** et conservant une très grande valeur même après un long usage.

Les médecins achètent leur “Minerva,” à la **société anonyme motraco**  
**44, rue des goujons à bruxelles**

## **Pensionnat Français "MAJOLICA..**

333, Avenue Molière, Bruxelles, Tél. 44.35.30



---

---

Pour finir l'éducation et  
l'instruction des jeunes fil-  
les : Langues, arts, sports

---

---

DIRECTRICE :  
*M<sup>lle</sup> Marg. J. VRIENS*

# VITTEL

## GRANDE SOURCE

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE

## SOURCE HEPAR

LITHIASE BILIAIRE - COLIQUES HÉPATIQUES

ÉTABLISSEMENT THERMAL  
DE PREMIER ORDRE

**Saison : 20 Mai - 25 Septembre**

---

**LISTE ALPHABÉTIQUE  
DES INDICATIONS  
THÉRAPEUTIQUES**

---

# Liste alphabétique des indications thérapeutiques

---

## **Abcès.**

	N <sup>os</sup>
Berkendyl... ..	24
Créosoforme ... ..	49
Lébénol ... ..	150
Immuno-antivirus staphylococcique ... ..	121
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Peptonate d'étain ... ..	200
Sirop Jackson ... ..	236
Stannolip Henry ... ..	242
Stannobardane Henry ... ..	241
Urénile injectable ... ..	260
Vaccin antistaphylococcique Bios ... ..	271

## **Accouchements.**

Berkendyl... ..	24
Cuprogynol. ... ..	50
Hormopituine Bios... ..	106
Lysomol ... ..	157
Néo pituitairine. ... ..	163
Poudre gynol ... ..	212

## **Acné.**

Onguent immunisant Bios ... ..	172
--------------------------------	-----

## **Actinomyose.**

Peperiodon Henry ... ..	199
-------------------------	-----

## **Addison (Maladie d').**

Extrait surrénal « Meurice », ... ..	75
Extrait surrénal Bios ... ..	246

## Adénites.

Bismuth 25. ....	32
Trépocidine (si d'origine syphilitique) ...	254
Arsebényl, Goyl (si d'origine syphilitique) ...	21, 89

## Adiposité.

Hypophyse Lobe antérieur Bios ...	110
Ovaridine « Meurice » ...	184
Ovarine « Meurice » ...	181
Thyroïdine « Meurice » ...	251
Thyroïdine Bios ...	249

## Adynamie.

Nuxyl. ....	169
Thiosote ...	248

## Agitation.

Bromovaléron Henry ...	34
Carni Marsine... ..	37
Pébromon Henry ...	198
Vespéral ... ..	281

## Alimentation infantile.

Alimentine Mory ... ..	5
Poudres de croissances vitales Bios ...	211

## Amaigrissement.

Carni Marsine... ..	37
Hématéol Bios... ..	101
Nucléarrhol Gabriel.. ..	168
Nuxyl. ....	169
Sérotonine Bios... ..	229
Sirop Helba ... ..	100

## Aménorrhée.

Ovaridine Meurice... ..	182
Ovarine Meurice ... ..	184
Ovarine Bios ... ..	182
Ovarine Optima ... ..	185



Ovaro-thyroïdine Optima	186
Quinovarine Optima	218
Vascularine	278
Vin Oophorine..	282

### **Amibiase.**

Chardyl	39
Chlorémétine Bios	42

### **Amygdalite.**

Berkendyl (gargarisme).	24
Galform	83

### **Anaphylaxie.**

Anaphylactine Bios...	10
Biorénine Bios...	28
Extrait surréal Meurice	75
Lacrénile	143
Peptone Cornelis	201

### **Anémie.**

Arseno-fer Henry	22
Carni-Marsine...	37
Extrait hépatique Bios	70
Fer Henry.	77
Goyl	89
Hématéol Bios...	101
Hémoferrine Optima	102
Hemopoïne du D <sup>r</sup> Schol	103
Mangano-fer Henry.	160
Nuxyl..	169
Sérum nevrotone	231
Sérotinine Bios	229
Sérum sthénique	232
Sirop Helba	100
Sirop d'Hémoglobine méthylarsiné Henry	235
Sirop Helba	100
Vitergomine	285

### **Anesthésie générale.**

Chloroforme Bios	
Chloroforme Meurice	43

Chloroforme Optima ... ..	14
Chlorure d'éthyle Bios ... ..	
Chlorure d'éthyle Meurice ... ..	45
Ether Bios... ..	
Ether Meurice... ..	63

### Anesthésie locale.

Biocaïne Bios (novocaïne-adrénaline) ... ..	
Bromure d'éthyle Optima ... ..	14
Chlorure d'éthyle Meurice ... ..	35

### Angines.

Aldéhyd ... ..	3
Berkendyl... ..	24
Forchinyl... ..	79
Galform ... ..	83

### Angine de poitrine.

Dragées iodurine Optima ... ..	57
Iodo-Theïne Henry.. ..	138
Hypotencrine Bios... ..	112
Pandigitale. ... ..	194
Pepiodon Henry ... ..	199
Vascularine ... ..	278

### Angiocholite.

Lactyl comprimés ... ..	146
Lactyl granulé chocolaté ... ..	147
Urométine... ..	262
Urénile (comprimés) ... ..	258
Urénile effervescent. ... ..	259

### Anorexie.

Poudre Méral... ..	161
Trizymol ... ..	255

### Anthrax.

Berkendyl... ..	24
Alphase D. ... ..	7

Créosoforme ... ..	49
Immuno-antivirus staphylococcique ... ..	121
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Peptonate d'étain Henry ... ..	200
Salantale (pommade) ... ..	221
Stannobardane Henry ... ..	241
Stannolip Henry ... ..	242
Staphylovaccin U. T. A. ... ..	243
Vaccin antistaphylococcique Bios ... ..	271

### **Antisepsie.**

Berkendyl (externe). ... ..	24
Chloraseptine ... ..	41
Cuprognynol ... ..	50
Créosoforme (externe) ... ..	49
Lysomol ... ..	157
Philogyne... ..	204
Urénile (interne) ... ..	258
Urométine (interne) ... ..	262

### **Anxiété.**

Vespéral ... ..	281
-----------------	-----

### **Aortite.**

Vascularine ... ..	277
--------------------	-----

### **Aphtes.**

Poudre Méral... ..	161
Berkendyl (collutoires) ... ..	24

### **Appendicite.**

Bactériophage Bios... ..	286
Entérocolibacilline Bios... ..	276
Exonérine... ..	65
Idéolaxine... ..	113
Urénile ... ..	258
Urométine... ..	262

### **Artériosclérose.**

Dragées d'iodurine Optima ... ..	58
Iodurine Optima ... ..	134

Iodotropine Bios	137
Iophénal	140
Pepiodon Henry	199
Solféine	238
Thyroidine Bios	249
Vascularine	278

### Arthrites.

Acyline	3
Alphase R.	8
Glycyl (externe)	86
Iodotropine Bios	137
Iodophane Bios.	135
Pharmétan intramusculaire	203
Pharmétan intraveineux	203
Vascularine	278

### Arthritisme.

Alphase R.	8
Iodonine Optima	134
Iodotropine Bios	137
Pepiodon Henry	199
Thyroidine Bios	249
Urénille effervescent.	259
Urométine.	262
Vascularine	278

### Asthme.

Asthmacidine (amp.)	23
Anaphylase	
Extrait surrénal Meurice	75
Héparbiline	104
Iodyne Brown	139
Pepiodon Henry	199
Polysérum antiasthmatique A et D Bios	209-210
Rénapituine Bios	219
Sérum nevrotone	231
Solféine	238
Suprarénidine Optima	245
Vaccin antiasthmatique Bios.	263

### Asthénie.

Carni Marsine	37
Chloro magnésium Henry	44

Goyl ... ..	89
Hormoglandine Bios ... ..	105
Hématéol Bios... ..	101
Mangano-fer Henry... ..	160
Nuxyl ... ..	169
Sirop Helba ... ..	100
Sérum sthénique ... ..	232
Sérotonine Bios ... ..	229
Sirop de Kola Henry ... ..	234

### **Atonie gastro-intestinale.**

Poudre Méral... ..	161
Exonérine... ..	69
Fulgurol ... ..	81
Peptone Cornelis ... ..	201
Tri-zymol... ..	255
Sel Terwagne ... ..	227
Vasol Agar Bios ... ..	280

### **Atonie utérine.**

Hormopituine Bios... ..	106
Néo-pituitairine ... ..	163

### **Bactériurie.**

Entérocolibacilline Bios... ..	276
Urénile comprimé ... ..	258
Urénile effervescent... ..	259
Urénile injectable ... ..	260
Urométine... ..	262

### **Balanite.**

Créosoforme (poudre) ... ..	49
-----------------------------	----

### **Bartholinite.**

Créosoforme (onguent)... ..	49
Ovules immunisants Bios ... ..	173

### **Basedow (Maladie de).**

Antithyroïde Bios ... ..	18
Hypophyse Bios ... ..	109

Pepiodon Henry	199
Oio-thyroïdine Optima...	170

### **Blennorrhagie.**

Diplovaccin U. T. A.	56
Immunovaccin antigonococcique...	129
Urénile (comprimés)	258
Urométine (comprimés)	262
Uréthro-capsules Gynol	261

### **Blépharite.**

Immuno-antivirus staphylococcique	120
Ongent immunisant ophtalmologique Bios	172

### **Bronchite.**

Bronchitol Henry	36
Ethylase	64
Gaïatase	82
Iodo-théine Henry	138
Iodyne Brown...	139
Pepiodon Henry	199
Phosote	206
Serpoline	230
Sirop Mory	237
Taphosote (perles)	202
Thiosote	248
Vaccin antibronchitique, antigrippal Bios...	264

### **Broncho-pneumonie.**

Gaïatase	82
Immunisant antibroncho-pneumococcique	133
Iodyne Brown...	139
Phosote	206
Sirop Mory	237
Urénile injectable	260
Urométine (ampoules)	262
Vaccin antibronchitique, antigrippal Bios...	264
Vascularine	278

### **Brûlures.**

Alphase D.	7
Scaevoline A	223

Crésoforme. ....	49
Immuno-antivirus coli- spreto- staphylocoque (suppurés) .....	116

### Cachexie.

Hémoferrine Optima .....	102
Sérocholine Bios .....	228
Sérotinine Bios. ....	229
Sérum sthénique .....	232

### Calculs biliaires.

Boldine Optima. ....	92
Héparbiline .....	104
Lithagogne .....	156
Urénile (comprimés) .....	258
Urométine.. ....	262
Sel Brown. ....	226
Vasol Agar Bios .....	280

### Calculs urinaires.

Iodotropine Bios .....	137
Urénile (comprimés) .....	258
Urométine... ..	262

### Cancer.

Chloro-magnésium Henry .....	44
Anaphylase Bios .....	

### Céphalées.

Acyline .....	3
Apyrexine... ..	19
Dentalgine de Montréal.. ..	52
Iodophane Bios .....	135

### Chancre mou.

Arsébényl... ..	
Biquinyl .....	30
Bismuthyl... ..	33
Bismuth .....	32
Crésoforme. ....	49

Goyl ... ..	89
Trépocidine ... ..	234

### Chlorose.

Arséno-fer Henry ... ..	22
Carni Marsine... ..	37
Hématéol Bios... ..	101
Hémoferrine ... ..	102
Hormoglandine Bios ... ..	105
Mangano-fer Henry. ... ..	160
Néovarine... ..	165
Sérotonine Bios. ... ..	229
Sirop d'hémoglobine méthylarsiné Henry ... ..	235

### Cholécystite.

Entérocolibacilline Bios... ..	276
Formétine... ..	80
Urénile (comprimés) ... ..	258
Urométine... ..	262

### Chorée.

Bromo Valéron Henry ... ..	34
Carni Marsine... ..	37
Glycéro-tribromurine ... ..	85
Hyosciamine Optima ... ..	97
Pébromon Henry ... ..	198

### Cœur (Affections du).

Digitalis Purpuréa Optima ... ..	55
Digitaline Optima (granules) ... ..	94
Digistabiline ... ..	54
Extrait cardiaque Bios ... ..	68
Iodo-théine Henry... ..	138
Pandigitale Optima.. ... ..	194
Pépidon Henry ... ..	199
Sirop de kola Henry ... ..	234
Soliféine ... ..	238
Vascularine ... ..	277

### Colibacillémies.

Entérocolibacilline Bios... ..	276
Urénile injectable ... ..	260



Urométine... ..	262
Vaccin anticolibacillaire Bios .....	265

### Colibacilluries.

Entérocolibacilline Bios... ..	276
Urénile .....	258
Urométine... ..	262
Vaccin anticolibacillaire Bios .....	265

### Côlites.

Entérocolibacilline Bios... ..	276
Lébénol (lavements) .....	150
Salicaire Henry. ....	222

### Conjonctivites.

Collyre immunisants Bios .....	175
Immunisant antivirus pneumo-staphylococcique. ....	120
Onguent ophtalmologique Bios .....	172
Pansements immunisants ophtalmologique... ..	175

### Constipation.

Aloïne Optima (granules) .....	96
Cascara Henry.. ..	38
Chardylax... ..	40
Cholédol (pilules)... ..	46
Exonérine... ..	65
Extrait biliaire Bios .....	66
Fulgurol .....	81
Laxatine Mory.. ..	148
Laxolip Henry... ..	149
Sel Brown... ..	226
Sel Terwagne... ..	227
Vasol Agar Bios .....	280

### Convalescence.

Arséno-fer Henry .....	22
Biocalcine... ..	27
Carni Marsine... ..	37
Fer Henry.. ..	77
Galform .....	83

Hémopoïne du D <sup>r</sup> Schol	103
Hématéol Bios...	101
Hormoglandine Bios	105
Mangano-fer Henry	160
Nuxyl.	169
Sérum nevrotone	231
Sérotinine Bios	229
Sérum sthénique (gouttes)	232
Sirop d'hémoglobine méthylarsine Henry	235
Sirop Helba	100
Sirop de kola Henry	234

**Convulsions.**

Parathyroïde Bios	197
Vespéral	281

**Coqueluche.**

Eau fluoroformée Meurice	61
Ethylase	64
Névrosan	167
Phosote	206
Pulmaseptine Bios	216
Sédarsan	225
Serpoline	230
Sirop bromoformique Henry	233

**Coryza.**

Arhine.	20
Coryzol	48
Galform	83
Onguent surrénal	176
Urénile (comprimés)	258

**Crises anaphylactiques.**

Anaphylase	
Biorénine Bios...	29
Extrait surrénal Meurice	75

**Crises nitritoïdes.**

Biorénine Bios...	29
Extrait surrénal Meurice	75

## Cryptorchidie.

Orchitine Meurice ... ..	180
--------------------------	-----

## Cystites.

Formétine... ..	80
Immuno antivirus colibacillaires ... ..	115
Iodotropine Bios ... ..	137
Lébénol (lavages)... ..	150
Urénile (comprimés) ... ..	258
Urénile injectable ... ..	260
Urométine... ..	262

## Dacryocystites.

immunisant antivirus pneumo-staphylococcique. ... ..	120
Onguent immunisant Bios ... ..	172

## Décalcification.

Carni Marsine... ..	37
Extrait surrénal Meurice ... ..	75
Nuxyl. ... ..	169
Phospho-calcine ... ..	205

## Délires.

Vespéral ... ..	280
-----------------	-----

## Dépression.

Carni Marsine... ..	37
Hormoglandine Bios. ... ..	105
Neurotonine Optima ... ..	166
Nuxyl. ... ..	169
Nucléarrhol Gabriel ... ..	168
Sérum sthénique ... ..	232
Sérotonine Bios ... ..	229
Siróp de kola Henry ... ..	234

## Dermatose.

Alphase D. ... ..	7
Anaphylactine Bios. ... ..	10
Créosoforme ... ..	49

Hépariline	104
Lacrénile	143
Lactocaséol Bios	144
Polyprotéine Bios	208
Scaevoline B	224

### Diabète.

Pancréine Bios	193
Urénile injectable	260
Urométine	262

### Diabète insipide.

Hypophise totale Bios	111
-----------------------	-----

### Diarrhée.

Acétyl-tanin Meurice	2
Lacto ferment Optima	145
Lactyl comprimé	146
Lactyl granulé chocolaté	147
Papaïne Henry	195
Salicaire Henry	222

### Diphthérie.

Anatoxine Bios	13
Berkendyl (gargarismes)	24

### Douleurs.

Acyline	3
Glycyl	86
Iodophane	135

### Dysenterie.

Bactériophage antidysentérique Bios	286
Créosoforme (supp.)	49
Lactyl comprimé	146
Lactyl granulé chocolaté	147
Salicaire Henry	222
Sel Brown	236

### Dysenterie amibienne.

Chardyl	39
---------	----

Chlorémétine Bios...	42
Goyl ...	89

### Dysménorrhée.

Antiphlébine (comprimés) ...	16
Dentalgine Montréal ...	52
Extrait surrénal Meurice ...	75
Lipovarine Bios ...	
Nevrosan ...	167
Ovarine Bios ...	182
Ovarine Optima ...	185
Ovarine Meurice ...	181
Ovaridine Meurice... ..	182
Promenyl (comprimés)... ..	214
Quinovarine Optima ...	218
Vin oophorine... ..	283
Vascularine ...	278

### Dyspepsie.

Duopancréine Bios... ..	59
Dyspeptase Bios ...	60
Digestif Henry.. ...	53
Gastryl ...	84
Kino pancréatine Henry ...	142
Nucléarrhol Gabriel. ...	168
Poudre stomachique Méral ...	161
Sédarsan ...	225
Tri-zymol... ..	255

### Dyspnée.

Extrait surrénal Meurice ...	75
Iodothéine Henry ...	138
Rénapituine Bios ...	219
Spartéine Optima (granules) ...	98
Taphosote.. ...	202

### Dystrophie adipo-génitale.

Hypophyse lobe ant. Bios ...	110
Orchitine Meurice ...	180
Ovaridine Meurice... ..	181
Thyroïdine Meurice. ...	251

## Eczémas.

Acétolan (pommade) ... ..	1
Alphase D. ... ..	7
Antiphlébine (comprimés) ... ..	16
Anaphylase ... ..	10
Anaphylactine Bios. ... ..	49
Créosoforme ... ..	146
Lactyl comprimé ... ..	144
Lactocaséol Bios ... ..	143
Lacrénile ... ..	208
Polyprotéine Bios ... ..	221
Salantale (pommade) ... ..	224
Scaevoline B ... ..	

## Emphysème pulmonaire.

Iodo-théine Henry ... ..	138
Pandigitale. ... ..	194
Pepiodon Henry ... ..	199
Rénapituine Bios ... ..	219
Soliféine ... ..	238
Serpoline ... ..	230
Sirop Mory ... ..	237
Taphosote... ..	202
Vaccin antiasthmatique Bios. ... ..	263
Vascularine ... ..	278

## Empoisonnements.

Sel Brown. ... ..	226
-------------------	-----

## Encéphalites.

Iodotropine Bios ... ..	137
Pharmétan. ... ..	203
Urénile injectable ... ..	260
Ūrométine... ..	262

## Enrouement.

Aldéhyl ... ..	4
Coryzol ... ..	48
Ethylase ... ..	64
Galform ... ..	83
Iodyne Brown... ..	139

## Engelures.

Alphase D. ....	7
Créosoforme ....	42
Scaevoline B ....	224

## Entérites.

Acétyl-Tanin Meurice ....	2
Entérocolibacilline Bios ....	276
Lactyl (comprimés) .....	146
Lactyl chocolaté ....	147
Lacto ferment Optima ....	145
Salicaire Henry .....	222
Vasol Agar Bios ....	280
Bactériophage antidysentérique ....	286

## Entérites parasitaires.

Chardyl ....	39
--------------	----

## Entéro-côlites.

Cholédol ....	46
Entérocolibacilline Bios ....	276
Formetine .....	80
Idéolaxine .....	113
Lebenol ....	150
Urénile ....	258
Urométine .....	262

## Epididymites.

Vaccin antigonococcique Bios ....	266
-----------------------------------	-----

## Epilepsie.

Glycéro-tribromurine ....	85
Pébromon Henry ....	198
Thyroidine Bios ....	249
Vespéral ....	281

## Epistaxis.

Extrait surrénal Meurice ....	75
-------------------------------	----

## Eréthisme cardio-vasculaire.

Vascularine ... ..	278
--------------------	-----

## Erysipèle.

Créosoforme ... ..	49
Onguent immunisant Bios ... ..	173
Salantale (pommade) ... ..	221
Urénile injectable ... ..	260
Urométine... ..	262
Vaccin antistreptococcique Bios ... ..	270

## Erythème.

Alphase D. ... ..	7
Créosoforme ... ..	49
Scaevoline A ... ..	223

## Escarres.

Alphase D. ... ..	7
Berkendyl... ..	24
Créosoforme ... ..	49
Onguent immunisant Bios ... ..	172
Poudre golygol... ..	88

## Excitation.

Carni Marsine... ..	37
Vespéral ... ..	280

## Fermentations.

Cholédol ... ..	46
Lactyl... ..	146
Sel Brown... ..	226

## Fièvres.

Acyline ... ..	3
Immunovaccin antistreptococcique. ... ..	125

## Fistules anales.

Alphase D. ... ..	7
Berkendyl... ..	24



Crésiforme (suppositoires) ... ..	49
Onguent immunisant Bios ... ..	173
Onguent Scaevoline B ... ..	224
Suppositiores Scaevoline B ... ..	224
Suppositoires gynol à la percaïne ... ..	224

### **Fistules.**

Alphax D. ... ..	7
Crésiforme, ... ..	49
Lébérol ... ..	150
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Onguent Scaevoline B ... ..	224
Supposit. Scaevoline B... ..	224

### **Foie (Affections du).**

Chardylax... ..	40
Chloro magnesum Henry ... ..	44
Dragées hépatiques Optima... ..	57
Excen rine... ..	65
Extrait hépatique Bios ... ..	70
Extrait biliaire Bios... ..	66
Hépariline. ... ..	104
Lithagogue.. ... ..	156
Sel Brown.. ... ..	226

### **Folliculite.**

Anastaphylotoxine Bios... ..	12
Onguent immunisant Bios ... ..	173

### **Furonculose.**

Alphax D. ... ..	7
Berkendyl (pansement)... ..	24
Immuno antivirus staphylococcique ... ..	121
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Salantale pommade... ..	221
Scaevoline B ... ..	224
Stannolip Henry ... ..	242
Stannobardane Henry ... ..	241
Staphylovaccin U. T. A. ... ..	243
Peptonate d'étain ... ..	200
Vaccin antistaphylococcique Bios ... ..	269

## **Gastro-entérite.**

Acétyl-Tanin Meurice ... ..	2
Duopancreïne Bios... ..	59
Dyspeptase Bios ... ..	60
Entérocolibacilline Bios... ..	276
Lactyl... ..	146
Papaine Henry.. ..	195
Sel Brown.. ..	226

## **Gerçures.**

Acetolan (pommade) ... ..	1
Alphase D. ... ..	7
Créosoforme ... ..	49
Scaevoline A ... ..	223

## **Gigantisme.**

Nuxyl. ... ..	169
---------------	-----

## **Gingivites.**

Berkendyl... ..	24
Galform ... ..	83
Dentalgine Montréal ... ..	52

## **Goitre exophtalmique.**

Antithyroïde Bios ... ..	18
Extrait de thymus Bios... ..	76
Hypophyse Bios ... ..	109
Nuxyl.. ..	169
Oio thyroïdine Optima... ..	170
Pepiodon Henry ... ..	199
Thymupituïne Bios... ..	199
Vascularine ... ..	278

## **Gonococcies.**

Urétro capsules gynol ... ..	261
Urénile ... ..	258
Urométine... ..	262
Vaccin antigonococcique Bios ... ..	266

## Goutte.

Acyline ... ..	3
Alphase R.. ... ..	8
Colchicine Optima... ..	93
Jécorine ... ..	141
Iodophane Bios. ... ..	135
Pharmétan... ..	203
Urénile ... ..	258
Urométine... ..	262

## Grippe.

Acyline ... ..	3
Carni Marsine... ..	37
Entérocolibacilline Bios... ..	276
Galform ... ..	83
Immuno vaccin antigrippal ... ..	127
Immunisant antivirus grippal ... ..	118
Nucléarrhol Gabriel. ... ..	168
Sirop de kola Henry ... ..	234
Sirop Mory ... ..	237
Urénile injectable ... ..	260
Urométine... ..	262
Vaccin antibronchitique antigrippal Bios ... ..	264

## Hématémèse.

Hydrastinine Optima (granules).. ... ..	96
---	----

## Hématurie malarique.

Forchinyl... ..	79
Sphéroïdes au chlorhydrate de quinine Meurice ... ..	240

## Hémophilie.

Hormopituine Bios... ..	106
Nuxyl... ..	169
Polyprotéine Bios ... ..	208

## Hémoptysie.

Chlorémétine Bios ... ..	42
Hydrasténine Optima (granules).. ... ..	96
Hormopituine Bios... ..	106

## Hémorragies.

Chlorémétine Bios ... ..	42
Extrait surrénal Meurice ... ..	75
Hormopitutine Bios... ..	106
Hydrastinine Optima ... ..	96
Polyprotéine Bios ... ..	208
Suprarénidine Optima ... ..	245

## Hémorroïdes.

Antiphlébine (comprimés) ... ..	16
Crésoforme (supposit.).. ... ..	49
Fulgurol ... ..	81
Hydrastinine Optima (granules).. ... ..	96
Hormoveinine Bios M. et F. ... ..	107
Onguent surrénal Meurice ... ..	176
Scaevoline (onguent et supp.) ... ..	224
Supp. Gynol percaïne ... ..	244

## Herpès.

Alphase D. ... ..	7
Crésoforme (poudre) ... ..	49

## Hyperchlorhydrie.

Digestif Henry... ..	53
Gastryl. ... ..	84
Poudre stomachique Méral ... ..	161

## Hyperhydrose.

Crésoforme ... ..	49
-------------------	----

## Hypertension.

Anabolin Bios... ..	9
Hypotencrine Bios... ..	112
Pepiodon Henry ... ..	199
Vascularine ... ..	278

## Hypochlorhydrie.

Dyspeptase Bios ... ..	60
------------------------	----

## Hypotension.

Carni Marsine... ..	37
Biorénine Bios... ..	28
Extrait surrénal Meurice ... ..	75

## Hypoovarie.

Ovarine Bios ... ..	182
Ovarine Meurice... ..	184
Ovarine Optima ... ..	185
Ovaridine Meurice... ..	181
Quinovarine Optima ... ..	218
Thyrovarine Bios ... ..	252
Vin oophorine... ..	283

## Hystérie.

Carni Marsine... ..	37
---------------------	----

## Ictère.

Chardylax... ..	40
Cholédol ... ..	46
Héparbiline. ... ..	104
Urométine... ..	262

## Impétigo.

Acétolan (pommade) ... ..	1
Immuno antivirus antistaphylococcique ... ..	124
Ouguent immunisant Bios ... ..	172
Peptonate d'étain Henry ... ..	200
Salantale (pommade) ... ..	221
Staphylovaccin U. T. A. ... ..	243

## Impuissance.

Hormoglandine Bios M. ... ..	105
Lipo orchitine Bios... ..	154
Orchidine Optima ... ..	178
Orchitine Meurice ... ..	180
Orchitine Bios... ..	179

## Incontinence.

Hypophyse Bios ... ..	109
Néo pituitairine ... ..	163
Nuxyl.. ... ..	169

## Infantilisme.

Hormoglandine Bios M. ou F. ... ..	105
Hypophyse Bios lobe antérieur ... ..	110
Oio-thyroïdine Optima... ..	170
Néothyrol... ..	164
Poudres de croissance vitales Bios ... ..	211
Orchitine Bios... ..	179
Orchitine Meurice ... ..	180

## Infections puerpérales.

Cuprogynol ... ..	50
Crésoforme (ovules) ... ..	49
Formétine... ..	80
Iodotropine Bios ... ..	137
Ovules immunisants Bios ... ..	173
Urénile injectable ... ..	260
Urométine (ampoules) ... ..	261
Vaccin Bios polymicrobien formule Delbet ... ..	78

## Insomnies.

Bromovaléron Henry ... ..	34
Sédarsan ... ..	225
Vespéral ... ..	280

## Insuffisance hépatique.

Cholédol ... ..	46
Extrait hépatique Bios ... ..	70

## Insuffisance testiculaire.

Hormoglandine M Bios... ..	105
Orchidine Optima ... ..	178
Orchitine Bios... ..	179
Orchitine Meurice ... ..	180

## Interventions chirurgicales.

Bromure d'éthyle Meurice ... ..	35
Chloroforme Meurice ... ..	43
Chloroforme Optima ... ..	14
Chlorure d'éthyle Meurice ... ..	45
Cylodyol ... ..	51

Ether Meurice...	63
Lysomal ...	157
Pansements immunisants Bios ...	174

### **Intoxications digestives.**

Bactériophage Bios...	286
Dyspeptase Bios ...	60
Entérocolibacilline Bios...	276
Hépariline ...	104
Laxolip Henry...	149
Peptone Cornelis ...	201
Poudre stomachique Meral ...	161
Sel Brown...	226

### **Iritis.**

Iodotropine Bios ...	137
Lactocaséol ...	144

### **Laryngite.**

Aldéhyl ...	4
Galform ...	13

### **Lèpre.**

Graumanyl. ...	29
----------------	----

### **Leucémie.**

Hémoferrine ...	102
Moelle osseuse Bios ...	162

### **Leucorrhée.**

Cuprogynol ...	50
Berkendyl (injections) ...	24
Créosoforme (ovules) ...	49
Nuxyl. ...	169
Ovules gynol-thygénol ...	212
Ovules immunisants Bios ...	173
Poudre gynol ...	212

## Lithiase biliaire.

Chardylax... ..	40
Cholédol (pilules) ... ..	46
Extrait biliaire Bios... ..	66
Héparbiline ... ..	104
Lithagoque ... ..	156
Lithiné Henry... ..	158
Urométine... ..	262

## Lithiase urinaire.

Urénile ... ..	258
Urométine... ..	262

## Lumbago.

Alphase D. ... ..	7
Apyrexine... ..	19
Dentalgine de Montréal... ..	52
Glycyl ... ..	86
Iodophane Bios. ... ..	135

## Lupus.

Alphase D. ... ..	7
Créosoforme ... ..	49
Imminus antivirius tuberculeux ... ..	117
Jécorine ... ..	141
Pulmaseptine Bios ... ..	216
Sérocholine Bios ... ..	228

## Lymphatisme.

Biocalcine... ..	27
Carni Marsine... ..	37
Hématéol Bios... ..	101
Hormoglandine Bios ... ..	105
Néothyrol... ..	164
Sérotonine Bios ... ..	229
Nucléarrhol Gabriel... ..	168
Vitergomine ... ..	285

## Maladies infectieuses.

Formetine... ..	80
Iodotropine Bios ... ..	137



Lacrénile ... ..	143
Pharmétan... ..	203
Urénile (toutes formes)... ..	258-259-260
Urométine... ..	262
Vaccin polymicrobien Bios (formule Delbet) ... ..	78

### **Malaria.**

Forchinyl... ..	79
Goyl... ..	89
Quinio Goyl ... ..	217
Sérotonine Bios ... ..	229
Sphéroïds du chlorhydrate de quinine ... ..	240

### **Mastite.**

Berkendyl (pansements)... ..	24
Salantale pommade... ..	221

### **Mélancolie.**

Carni Marsine... ..	37
Glycéro-tribromurine ... ..	85
Nucléarrhol Gabriel... ..	168

### **Méningites.**

Iodotropine Bios ... ..	137
Pharmétan... ..	203
Urénile injectable ... ..	260
Urométine (ampoules) ... ..	262

### **Ménopause.**

Antiphlébine ... ..	16
Néovarine (comprimés) ... ..	165
Nuxyl... ..	169
Névrosan ... ..	167
Ovaridine Meurice... ..	181
Ovarine Bios ... ..	182
Ovarine Meurice ... ..	184
Ovarine Optima ... ..	185
Promenyl (comprimés)... ..	214
Quinovarine (dragées) ... ..	218
Thyrovarine Bios ... ..	252

Vascularine ... ..	278
Vin oophorine... ..	283

### Ménorragies.

Corps jaune Bios ... ..	47
-------------------------	----

### Métrites.

Créosoforme (ovules) ... ..	49
Cuprogynol ... ..	50
Lébénol ... ..	150
Ovules gynol ichtyol ... ..	188
Ovules immunisants Bios ... ..	173
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Poudre golygol.. ... ..	88
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Vaccin Bios (formule Delbet) ... ..	78

### Métrorragies.

Anti-phlébine (comprimés) ... ..	16
Extrait mammaire Bios ... ..	71
Hormopituine Bios... ..	105
Mamelline Meurice.. ... ..	159

### Migraine.

Acyline ... ..	3
Anaphylactine Bios.. ... ..	10
Dentalgine Montréal ... ..	52
Héparbiline ... ..	104
Lactyl comprimés ... ..	146
Polyprotéine Bios ... ..	208

### Myélites.

Iodotropine Bios ... ..	137
Pharmétan.. ... ..	203
Vaccin Bios (formule Delbet) ... ..	78

### Myocardites.

Extrait cardiaque Bios ... ..	68
Extrait surrénal Meurice ... ..	75

Pandigitale Optima...	194
Vascularine ...	278

### Myxœdèmes.

Néothyrol...	164
Oio thyroïdine Optima...	170
Ovaridine Meurice...	184
Thyroïdine Bios	249
Thyroïdine Meurice.	251
Thyrovarine Bios	252

### Néphrites.

Extrait de rein Bios	73
Suprarénidine Optima	245

### Neurasthénie.

Biocalcine...	27
Carni Marsine...	37
Hématéol Bios...	101
Hormoglandine Bios	105
Lipo cérébrale Bios...	151
Nucléarrhol Gabriel...	168
Phospho calcine	205
Sirop de kola Henry	234
Sérotinine Bios	229
Sirop Jackson	236
Sérum névrotone	231

### Névralgies.

Acyline	3
Alphase R.	8
Apyrexine...	19
Dentalgine Montréal	52
Iodophane Bios.	135
Iophénal	140
Pharmétan...	203

### Névrose.

Carni Marsine...	37
Glycéro-tribromurine	85
Nuxyl...	169
Vespéral	281

## Obésité.

Endoxidina. ....	62
Néothyrol... ..	164
Néovarine... ..	165
Oio-thyroïdine Optima... ..	170
Ovaridine Meurice... ..	181
Pepiodon Henry ... ..	199
Thyroïdine Bios ... ..	249
Thyroïdine Meurice. ... ..	251
Thyrovarine Bios ... ..	259
Sel Brown... ..	226

## Œdèmes.

Antiplébine (comprimés) ... ..	16
Digitaline Optima (gran.) ... ..	194
Solféine ... ..	238

## Oligurie.

Chloro magnésium Henry ... ..	44
-------------------------------	----

## Ophthalmie.

Onguent immunisant Bios ... ..	173
Pansements immunisants ophtalmologiques Bios ... ..	175

## Orchites.

Urénile injectable ... ..	260
Urénile ... ..	258
Vaccin antigonococcique Bios ... ..	266

## Oreillons.

Anaphylactine Bios.. ... ..	10
Urénile injectable ... ..	260
Urométine... ..	262

## Ostéo-malacie.

Extrait surrénal Meurice (avec calcium)... ..	76
Extrait surrénal Bios ... ..	74

## Ostéo-myélite.

Pansements immunisants Bios	174
Vaccin antistaphylococcique Bios	269

## Otitis.

Galform	13
Lébénol	174
Pansements immunisants Bios	174
Onguent immunisant Bios	173
Salantale (pommade)	221
Urénile	258
Urométine	262

## Ovarites.

Ovules immunisants Bios	173
Pansements immunisants Bios	174
Urénile injectable	260
Urométine (ampoules)	262
Vaccin polymicrobien Bios (formule Delbet)	78

## Ozène.

Arhine	20
Coryzol	48

## Palpitations.

Vascularine	278
-------------	-----

## Paludisme.

Forchinyl	79
Goyl	89
Nuxyl	169
Quinio Goyl	217
Sérotonine Bios	229
Sphéroïds au chlorhydrate de quinine	240

## Panaris.

Berkendyl	24
Onguent immunisant Bios	172
Pansements immunisants Bios	174

Peptonate d'étain Henry	200
Salantale	221

### **Pancréas (Affections du).**

Duopancréine Bios	59
Kino-pancréatine Henry	142
Lactyl	146
Pancréine Bios	193
Urénile injectable	260
Urométine	262

### **Pansements.**

Berkendyl	24
Bismoquinol Bios	31
Créosoforme	49
Lébénol	150

### **Paralysie agitante.**

Hyosciamine Optima (granules)	97
-------------------------------	----

### **Paralysie générale.**

Arsébényl	21
Biquinyl 50 %	30
Bichloryl	25
Bismuthyl	33
Goyl	89
Lactocaséol Bios	144
Lipo-cérébral Bios	151
Lipo-orchitique Bios	154
Pansements immunisants Bios	174

### **Parkinson (Maladie de).**

Parathyroïde Bios	197
-------------------	-----

### **Pelade.**

Antithyroïde Bios (nerveuse)	18
------------------------------	----

### **Péritonites.**

Polyprotéine Bios	208
Urénile injectable	260
Vaccin Bios (formule Delbet)	78

## Pharyngite.

Aldehyl ... ..	4
Berkendyl... ..	24
Galform ... ..	83
Urénile comprimé ... ..	258
Urométine... ..	262

## Phlébite.

Hormovéine Bios... ..	107
Scaevoline B (onguent) ... ..	224

## Phlegmons.

Créosoforme ... ..	49
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Urénile injectable ... ..	260
Urométine (ampoules) ... ..	262
Vaccin antipyogène Bios ... ..	268

## Phosphaturie.

Phospho calcine ... ..	205
Sérum sthénique (gouttes) ... ..	232

## Pian.

Bismoquinol Bios ... ..	31
Goyl ... ..	89

## Plaies.

Alphase D. ... ..	7
Berkendyl... ..	24
Chloraseptine ... ..	41
Créosoforme ... ..	49
Immuno antivirus coli-, strepto-, staphylocoque ... ..	116
Lébérol ... ..	150
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Scaevoline B ... ..	224

## Plaies atones.

Alphase D. ... ..	7
Créosoforme ... ..	49
Lébénol ... ..	150
Poudre golygol... ..	88
Scaevoline B ... ..	224

## Pleurésie.

Thiosote ... ..	248
Vaccin antibronchitique, antigrippal Bios... ..	264

## Pneumonie.

Extrait surrénal Meurice ... ..	75
Immuno vaccin antibroncho-pneumococcique ... ..	133
Immuno vaccin antipneumococcique ... ..	132
Phosote ... ..	206
Pulmaseptine Bios ... ..	216
Urénile injectable ... ..	260
Urométine (ampoules ... ..	262
Vaccin antibronchitique antigrippal Bios ... ..	264
Vaccin antipneumococcique Bios... ..	267

## Prostatisme.

Chloro magnésium Henry ... ..	44
Extrait prostatique Bios... ..	
Fulgurol ... ..	81
Urénile injectable ... ..	260
Urométine... ..	262

## Prurits.

Acetolan pommade... ..	1
Anaphylactine Bios... ..	10
Chloro magnésium Henry ... ..	44
Peptone Cornélis ... ..	201
Onguent surrénal Meurice ... ..	176
Scaevoline B ... ..	224

## Psoriasis.

Alphase D. ... ..	7
Anaphylactine Bios... ..	10
Cuprogynol, ... ..	50



## Psychonévrose.

Carni Marsine... ..	37
Nuxyl.. ..	169
Sédarsan ... ..	225
Vespéral ... ..	281

## Puberté.

Hormoglantine Bios.. ..	105
Orchitine Meurice ... ..	180
Orchidine Optima ... ..	178
Ovarine Meurice ... ..	182
Ovarine Optima ... ..	185
Quinovarine Optima (dragées, ampoules) ... ..	218
Vin oophorine... ..	283
Vascularine ... ..	278

## Pyélite.

Bactériophage ... ..	286
Entérocolibacilline Bios... ..	276
Formétine... ..	80
Urénile (comprimés) ... ..	258
Urénile injectable ... ..	260
Urométine... ..	262
Vaccin anticolibacillaire Bios ... ..	265

## Pyorrhée.

Arsébényl... ..	21
Galform ... ..	83
Goyl ... ..	89

## Pyurie.

Urénile injectable ... ..	260
Vaccin antipyorrhéique Bios. ... ..	268
Urénile (toutes formes)... ..	258-259-260
Urométine... ..	262

## Rachitisme.

Biocalcine... ..	27
Carni Marsine... ..	37
Extrait surrénal Meurice ... ..	75

Hémopoïne du D <sup>r</sup> Schol	103
Hormoglandine Bios.	105
Pepiodon Henry	199
Phospho calcine	205
Néothyrol	164
Poudre de croissance vitale Bios.	211
Sirap Helba	100
Sirap Jackson	236
Thyroïdine Meurice.	251
Thyroïdine Bios	249
Vitamorrhéine	284
Vitergomine	285

### Radiodiagnostic.

Papavérine Meurice.	196
Repas baryté Meurice	220

### Rhinites.

Arhine.	20
Coryzol	48
Onguent surrénal Meurice	176

### Rhumatismes.

Alphase R.	8
Acyline	3
Alphanol	6
Glycyl.	86
Immuno vaccin antirhumatismal	130
Iophéna	140
Iodophane Bios.	135
Iodotropine Bios	137
Jécorine	141
Pharmétan.	203
Pépiodon Henry	199
Urénile injectable	260
Urométine.	262
Solution Henry.	239
Vaccin antirhumatisme Bios B. I. ou G.	272-273-274

### Salpingite.

Cuprogynol.	50
Pansements immunisants Bios	174

Ovules immunisants Bios	173
Ovules gynol	187
Urénile injectable	260
Urométine (ampoules)	262
Vaccin polymicrobien Bios (formule Delbet)	78

### Scarlatine.

Vaccin antistreptococcique Bios	270
---------------------------------	-----

### Sciatique.

Acyline	3
Arsébényl (sciatique syphilitique)	
Bismuthés (sciatique syphilitique)	33
Iodophane Bios	135
Pharmétan	203
Solution Henry	239

### Scrofulose.

Hormoglandine Bios	105
Néothyrol	164
Nucléarrhol Gabriel	168
Peptone Cornélis	201
Sirop Helba	100

### Sédatifs.

Ethylase	64
Ovules gynol-ichtyo-opio-mentholées	187
Sédarsan	225
Vespéral	280

### Sénilité précoce.

Carni Marsine	37
Chloro magnésium Henry	44
Hormoglandine M. Bios	105
Nuxyl	169
Orchidine Optima	178
Orchitine Bios	179
Orchitine Meurice	180

## Septicémie.

Formétine... ..	80
Iodotropine Bios ... ..	137
Polyprotéine Bios ... ..	208
Urénile injectable ... ..	260
Urométine... ..	262
Vaccin polymicrobien Bios (formule Delbet) ... ..	78

## Spasme du pylore.

Papavérine Meurice (pylorique)... ..	196
--------------------------------------	-----

## Spirillose.

Arsébényl... ..	21
Bichloryl ... ..	25
Biquinyl ... ..	30
Bismuthyl... ..	33
Bidratyl ... ..	26
Golarsyl ... ..	87

## Spirochétose.

Bismoquinol Bios ... ..	31
Bichloryl ... ..	25
Biquinyl ... ..	30
Bismuthyl... ..	33
Bidratyl ... ..	26
Golarsyl ... ..	87
Goyl ... ..	89

## Staphylococcies.

Onguent immunisant Bios ... ..	172
Pansements immunisants Bios ... ..	174
Peptonate d'étain Henry ... ..	200
Salantale (pommade) ... ..	221
Stannobardane Henry ... ..	241
Stannolip Henry ... ..	242
Staphylovaccin U. T. A. ... ..	243
Vaccin antistaphylococcique Bios ... ..	269

## Stase intestinale.

Chardylax... ..	40
Exonérine... ..	65

Fulgurol ... ..	81
Ideolaxine... ..	113
Sel Terwagne ... ..	227
Vasol Agar Bios ... ..	280

### Stomatite.

Berkendyl... ..	24
Galform ... ..	83

### Streptococcies.

Immuno vaccin antistreptococcique ... ..	125
Salantale (pommade) ... ..	221
Vaccin antistreptococcique Bios ... ..	270

### Sycosis.

Alphase D. ... ..	7
Arsébényl... ..	21
Onguent immunisant Bios ... ..	172
Salantale (pommade) ... ..	221
Stannolip Henry ... ..	242

### Syphilis.

Arsébényl... ..	21
Bichloryl ... ..	25
Bidranyl ... ..	26
Biquinyl 50 % ... ..	30
Bismoquinol Bios ... ..	31
Bismuth 25 (ampoules)... ..	32
Bismuthyl... ..	33
Golarsyl ... ..	87
Goyl (per os)... ..	89
Trépecidine (ampoules).. ..	254

### Tétanie.

Parathyroïdine Bios.. ..	197
--------------------------	-----

### Trachéite.

Aldéhyl ... ..	4
Galform ... ..	83
Perles Taphosote ... ..	202

## Troubles endocriniens associés.

Hormoglandine Bios formules spéciales de A à T Bios...	105
Orchitine Meurice ... ..	180
Ovaridine Meurice... ..	181
Ovaro thyroïdine Optima ... ..	186

## Troubles menstruels.

Dentalgine Montréal ... ..	52
Néothyrol... ..	164
Nuxyl... ..	181
Quinovarine (dragées ampoules)... ..	218
Ovarine Bios ... ..	187
Ovaridine Meurice... ..	182
Ovarine Meurice ... ..	184
Ovarine Optima ... ..	185
Ovaro thyroïdine Optima ... ..	186
Vascularine ... ..	278
Vin oophorine... ..	283

## Tuberculose médicale.

Antiphymase ... ..	17
Bronchitol Henry ... ..	36
Carni Marsine... ..	37
Iodotropine... ..	137
Iodyne Brown... ..	139
Nucléarrhol Gabriel... ..	168
Phosote ... ..	206
Pulmaseptine Bios ... ..	216
Sérotonine Bios A. B. C. D. ... ..	229
Sirop Helba (formes non congestives) ... ..	100
Taphosote... ..	202
Vitamorrhéine ... ..	284
Vitergomine ... ..	285

## Tuberculose chirurgicale.

Antiphymase ... ..	17
Créosoforme ... ..	49
Sérocholne Bios ... ..	228

## Trypanosomiase.

Tryponarsyl ... ..	256
--------------------	-----

## Typhoïde (Fièvre).

Bactériophage antityphique A et B Bios ... ..	275
Vaccin antityphique Bios ... ..	275
Vaccins Billies Bios antityphique et para A et B ... ..	277

## Ulcères.

Acétolan (pommade) ... ..	1
Alphase D. ... ..	7
Antiphlébine (comprimées) ... ..	16
Créosoforme ... ..	49
Onguent immunisant Bios ... ..	172
Scaevoline B (onguent).. ... ..	224

## Ulcère gastrique.

Digestif Henry.. ... ..	53
Gastryl ... ..	84
Lactocaseol Bios ... ..	144
Parathyroïdine Bios.. ... ..	197
Poudre Méral ... ..	161
Polyprotéine Bios ... ..	208

## Urémie.

Extrait de rein Bios ... ..	73
Hypotencrine Bios... ..	112
Vascularine ... ..	278

## Urétrites.

Immuno antivirus staphylococcique ... ..	122
Immuno vaccin antigonococcique.. ... ..	129
Urénile comprimé ... ..	258
Urénile injectable ... ..	260
Urétro-capsules gynol ... ..	261
Urométine comprimé ... ..	262
Urométine ampoule... ..	262

## Urticaire.

Alphase D., ... ..	7
Anaphylactine Bios.. ... ..	10
Héparbiline. ... ..	104
Lacrénile ... ..	143





